



Let op: Deze richtlijn is geldig op de datum van afdruk. Raadpleeg steeds de meest recente versie via het officiële platform op de NVvH website

PDF gemaakt op: 01-06-26 21:46

Initiatiefnemer: NVvH

Autorisatiedatum: 2024-01-09

Geautoriseerd door:

Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)

Uiterlijk in 2027 bepaalt dr. P.A.W te Boekhorst en het bestuur van de NVvH of deze richtlijn of module nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten. Dr. P.A.W. te Boekhorst is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke wat betreft de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Richtlijninformatie

Verantwoording

Onderwerp

Essentiële trombocytemie (ET) behoort samen met polycythemia vera (PV) en primaire myelofibrose (PMF) tot de Philadelphia chromosoom-negatieve myeloproliferatieve aandoeningen (MPN). Het is een relatief zeldzame aandoening met een geschatte incidentie van 0,2-2,3 per 100.000 inwoners per jaar. De ziekte manifesteert zich meestal in patiënten tussen 50-60 jaar, iets meer bij vrouwen dan bij mannen. Bij 50-60% van de ET patiënten kan een *JAK2 V617F* mutatie aangetoond worden, bij 30% een *CALR* mutatie en bij 3% een *MPL* mutatie. Ongeveer 12% van de patiënten heeft geen van deze 3 mutaties (tripel negatief).^{Swerdlow 2017} De richtlijn is reeds eerder geactualiseerd vanwege herziening van de diagnostische criteria in 2016 en de richtlijnen van European Leukemia Net (ELN)^{Arber 2016, Barbui 2018} De richtlijn is grotendeels gebaseerd op deze aanbevelingen. De huidige herziening is vanwege nieuwe WHO criteria en tekstuele afstemming met de andere MPN richtlijnen.

Doel

Deze richtlijn is bedoeld ter optimalisering van de diagnostiek, behandeling en poliklinisch vervolg van ET toepasbaar in alle Nederlandse ziekenhuizen (geen echelonering van toepassing).

Doelgroep

Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met ET, zoals internist-hematologen, internist-oncologen, internisten, etc.

Samenstelling werkgroep

Richtlijncommissie

- dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog/transfusiespecialist
- dr. S. Kersting, internist-hematoloog
- dr. R. Raymakers, internist-hematoloog
- dr. N.P.M. Schaap, internist-hematoloog
- dr. M.A. de Witte, internist-hematoloog
- dr. M. Wondergem, internist-hematoloog

De richtlijn werd beoordeeld en besproken door de navolgende leden van de werkgroep:

De richtlijn werd beoordeeld en becommentarieerd door de navolgende leden van de werkgroep.

- dr. E. Ammatuna, internist-hematoloog
- drs. F. Baboe, internist-hematoloog
- dr. P. van Balen, internist-hematoloog
- dr. B.J. Biemond, internist-hematoloog
- prof. dr. N.M.A. Blijlevens, internist-hematoloog
- dr. R.S. Boersma, internist-hematoloog
- dr. Y. Bilgin, internist-hematoloog
- dr. K. Hebeda, patholoog
- dr. A.H.E. Herbers, internist-hematoloog
- drs. F. C. J. I. Heubel-Moenen, internist-hematoloog
- dr. M. Hoogendoorn, internist-hematoloog
- dr. G.K.S. Jie, internist-hematoloog
- dr. S.K. Klein, internist-hematoloog
- dr. K.H. Lam, patholoog
- dr. M.N. Lauw, internist-hematoloog
- dr. V. Novotny, internist-hematoloog/transfusiespecialist
- dr. E.F.M Posthuma, internist-hematoloog
- dr. M.A.E. Rab, internist-hematoloog/laboratoriumspecialist Rode Bloedcel Diagnostiek
- dr. V. Novotny, internist-hematoloog
- dr. M.A.E. Rab, AIOs interne geneeskunde
- dr. N. Rayman, internist-hematoloog
- dr. B. van der Reijden, moleculair bioloog
- drs. B. Santbergen, internist-hematoloog
- prof. dr. H.C. Schouten, internist-hematoloog
- dr. T.J.F. Sniijders, internist-hematoloog
- dr. L.F.R. Span, internist-hematoloog
- dr. N. Thielen, internist-hematoloog
- drs. N. Tiren, internist-hematoloog
- dr. G.A. Velders, internist-hematoloog/medisch oncoloog
- drs. T. de Waal, internist-hematoloog
- dr. P. Westerweel, internist-hematoloog
- prof. dr. S. Zweegman, internist-hematoloog

Totstandkoming

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2017 de richtlijnwerkgroep MPN van de CML/MPN werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met MPN. Het betreft hierbij een aanpassing/actualisatie van de reeds bestaande richtlijn uit 2018.

Op voorstel van de richtlijnbeheerder dr. P.A.W. te Boekhorst heeft de richtlijnwerkgroep deconceptrichtlijnen per e-mail en fysieke bijeenkomsten becommentarieerd en aangepast. Deuitgangsvragen werden hierbij besproken en aanbevelingen gemaakt.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

Procedure voor commentaar en autorisatie

Een conceptversie van de richtlijn werd op 04-09-2023 voor commentaar aangeboden aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH). Commentaar geeft input vanuit het veld om de kwaliteit en de toepasbaarheid van de richtlijn te optimaliseren en landelijk draagvlak voor de richtlijn te genereren. Er is door de leden van de NVvH wel gebruik gemaakt van de commentaarronde. De richtlijn werd op 19-12-2023 door de HOVON-CML/MPN-werkgroep inhoudelijk vastgesteld en ter autorisatie gestuurd naar de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH). Het bestuur van de NVvH heeft de richtlijn op XX-XX-XXXX geautoriseerd.

In de verschillende fasen van de ontwikkeling van het concept van de richtlijn is zoveel mogelijk rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van deaanbevelingen.

Om het gebruik in de dagelijkse praktijk te bevorderen wordt deze richtlijn verspreid onder de professionals van de bij de totstandkoming van deze richtlijn betrokken organisatie(s):


- Per mail naar de leden van de NVvH
- Plaatsing van de richtlijn op de websites van Stichting HOVON (www.hovon.nl) en de NVvH (www.hematologienederland.nl)
- Een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie

Belangenverklaringen

De leden van de richtlijncommissie hebben verklaard onafhankelijk gehandeld te hebben bij het opstellen van de richtlijn en hebben belangenverklaringen [zie bijlage – Code KNAW/KNMG] ingevuld waarbij is aangegeven welke betrekkingen zij onderhouden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Een overzicht hiervan kunt u bij het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie opvragen.

	Belangen
dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog/transfusiespecialist	Novartis, Celgene (sprekersgeld), Abbvie (internationale adviesraad) KWF (onderzoeksgeld)
dr. S. Kersting, internist-hematoloog	Geen
dr. R. Raymakers, internist-hematoloog	Geen
dr. N.P.M. Schaap, internist-hematoloog	Onderzoeksgeld: Bristol Myers Squibb, Novartis, Abbvie, ZonMW, KWF
dr. M.A. de Witte, internist-hematoloog	Geen
dr. M. Wondergem, internist-hematoloog	Novartis Steering Committee MPN Trial

Methodie ontwikkeling en werkwijze



Kwaliteitsindicatoren

Diagnostiek

1. Bij alle patiënten is tenminste moleculair onderzoek (*JAK2*, *CALR*, *MPL* mutatie) of een beenmergonderzoek verricht
2. Bij patiënten met een bloedingsneiging is onderzoek verricht naar VvWD

Behandeling

3. Bij alle patiënten wordt behandeling met trombocyten aggregatieremmers overwogen

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. De richtlijn wordt digitaal verspreid onder alle relevante beroepsgroepen. Daarnaast wordt er eentoelichting op de richtlijn aangeboden aan het Nederlands tijdschrift voor Hematologie. Ook is de richtlijn te downloaden vanaf de websites van de NVvH (www.hematologienederland.nl) en HOVON (www.hovon.nl).

Inbreng patiëntenperspectief

De patiëntenorganisatie voor deze categorie patiënten is de MPN-stichting. Vertegenwoordigers van de MPN-stichting hebben zitting in de richtlijn werkgroep. Het bestuur is over de conceptrichtlijn geïnformeerd en in staat gesteld te reageren op de inhoud van deze richtlijn.

Samenvatting

Overzicht van alle aanbevelingen

Welk onderzoek is nodig bij de diagnose ET?

Aanbevelingen:

- Anamnese met aandacht voor algemene klachten, met name constitutionele symptomen (bij voorkeur met Myeloproliferative Neoplasm-Symptom Assessment Form (MPN- SAF vragenlijsten, Tabel 1), bloedingsneiging en cardiovasculaire risico
- Lichamelijk onderzoek: bloeddruk, miltgrootte
- Bloedbeeld (inclusief leucocyten differentiatie), reticulocyten, kreatinine, leverenzymen, LDH, urinezuur, ferritine, CRP, glucose, cholesterol/triglyceriden
- Mutatie bepaling: *JAK2V617F* mutatie (VAF $\geq 1\%$), *BCR::ABL1* mutatie (ter uitsluiting CML) en bij een negatieve testuitslag *CALR* en *MPL* mutatie (eventueel bepalingen tegelijkertijd, afhankelijk van werkwijze moleculair laboratorium)
- Beenmergbiopsie (Tabel 2)
- **Op indicatie:**
 - Echo milt bij twijfel over splenomegalie
 - In geval van verhoogde bloedingsneiging en/of indien trombocytose voorafgaand aan ingrepen met bloedingsrisico: sluit verworven von Willebrand type II (VvWD) uit middels bepaling van von Willebrand ristocetine activiteit en antigeen (ratio < 0.7)
 - Cytogenetisch onderzoek (bijvoorbeeld ter uitsluiting MDS) indien geen mutaties aangetoond

Welke (prognostische) risico groepen kunnen worden onderscheiden bij ET?

Aanbevelingen:

- Inschatten risico op thrombo-embolische complicaties op basis van IPSET criteria (Tabel 3)

Wanneer is gebruik van trombocyten aggregatieremming geïndiceerd bij ET?

Aanbevelingen:

- Alle patiënten met ET tenzij bloedingsneiging of VvWD
 - Acetylsalicylzuur 80 mg/carbasalaatcalcium 100 mg per dag
 - Indien er sprake is van klinische bloedingsneiging en/of VvWD (activiteit $< 30\%$) dient dit eerst met cytoreductieve therapie behandeld te worden. (SORT A)
 - overwogen kan worden te kiezen voor een avond dosering i.p.v. een ochtend dosering (SORT C)
- **Op indicatie:**
 - indien patiënt < 60 jaar en 0 punten bij IPSET, overweeg geen trombocytenaggregatieremming

Wanneer is gebruik van cytoreductieve therapie geïndiceerd bij ET en welk behandeldoel moet dan behaald worden?

Aanbevelingen:

- Indicaties voor start cytoreductieve therapie en behandeldoel:
 - Leeftijd > 60 jaar, streef trombocyten waarde $< 400 \times 10^9/l$
 - (doorgemaakt) trombo-embolische complicatie, streef trombocyten waarde $< 400 \times 10^9/l$
 - Trombocyten $> 1500 \times 10^9/l$ of VvWD, streef verlagen trombocyten en/of remissie VvWD
 - Symptomatische splenomegalie, streef verminderen klachten
 - ET gerelateerde symptomen die niet verbeteren na start trombocyten aggregatieremming, streef naar verminderen klachten

Welke cytoreductieve therapieën zijn geïndiceerd bij ET?

Welke cytoreductieve therapieën zijn geïndiceerd bij ET?

Aanbevelingen:

- 1^e lijn:
 - Gepegyleerd interferon α 2a (Pegasys®), start dosering 45-90 microgram/week s.c., geleidelijk ophogen naar optimale dosis op basis van respons en bijwerkingen (90/135/180 microgram). Verlenging van het interval (2-4 weken) bij stabiele hematologische respons kan overwogen worden
 - Hydroxycarbamide, start dosering 1dd 500-1000 mg oraal
- 2^e lijn:
 - Hydroxycarbamide, start dosering 1dd 500-1000 mg oraal
 - Gepegyleerd interferon α 2a (Pegasys®), start dosering 45-90 microgram/week c., geleidelijk ophogen naar optimale dosis op basis van respons en bijwerkingen (90/135/180 microgram). Verlenging van het interval (2-4 weken) bij stabiele hematologische respons kan overwogen worden.
 - Anagrelide, start dosering 2dd 0,5 mg, ieder week te verhogen met 0,5 mg/dag extra opgeleide van trombocyten Maximale dosis 10 mg/dag en 2,5 mg/gift.
 - Combinatie van behandelingen
 - Busulfan of melfalan, waarbij rekening gehouden moet worden met leukemogene effecten (bij voorkeur niet bij jongere patiënten toepassen)

Wat is het therapeutisch beleid bij zwangere met ET?

Aanbevelingen:

- **Behandeling bij geen risicofactoren (zie Tabel 4):**
 - Acetylsalicylzuur 80 mg/Carbasalaatcalcium 100 mg/dag
 - Hoog profylactische dosering laagmoleculair gewichtsheparine (LMWH) in het kraambed
 - Indien stijging trombocyten aantal $>1000 \times 10^9/l$ start gepegyleerd interferon α
- **Behandeling bij risicofactor(-en) (zie Tabel 4):**
 - Acetylsalicylzuur 80 mg/Carbasalaatcalcium 100 mg/dag
 - Start gepegyleerd interferon α 2a, streef naar trombocyten $<400 \times 10^9/l$
 - Hoog profylactisch LMWH gedurende gehele zwangerschap en het kraambed. Therapeutische dosering LMWH indien behandeling met orale antistollingstherapie voor de zwangerschap, anders profylactische dosering LMWH
 - Indien **alleen** de risicofactor trombocytose $>1000 \times 10^9/l$ aanwezig is kan volstaan worden met hoog profylactische dosering LMWH profylaxe enkel in het kraambed (naast trombocyten aggregatie remming en cytoreductieve therapie).

Het gebruik van ropeginterferon alfa-2b (Besremi®) tijdens de zwangerschap wordt niet geadviseerd omdat er onvoldoende data beschikbaar zijn.

Wat is het beleid bij een splanchnicus veneuze trombose bij ET?

Aanbevelingen

- Start cytoreductieve therapie indien trombocyten $>450 \times 10^9/l$ en streef bij behandeling naar trombocyten aantal $<400 \times 10^9/l$
- Er geldt een levenslange indicatie voor therapeutische antistolling (tenzij contra-indicatie)
- Overweeg trombocyten aggregatieremming naast therapeutische antistolling indien laag bloedingsrisico en recidief trombose onder adequate antistollingstherapie (SORT C)
- Als alternatief voor standaard behandeling met LMWH en/of VKA, overweeg directe werkende orale anticoagulantia (DOAC)s

Algemeen

Overzicht uitgangsvragen

1. Welk onderzoek is nodig bij de diagnose ET?
2. Welke (prognostische) risico groepen kunnen worden onderscheiden bij ET?
3. Wanneer is gebruik van trombocyten aggregatieremming geïndiceerd bij ET?
4. Wanneer is gebruik van cytoreductieve therapie geïndiceerd bij ET en welk behandeldoel moet dan behaald worden?
5. Welke cytoreductieve therapieën zijn geïndiceerd bij ET?
6. Wat is het therapeutisch beleid bij zwangere met ET?
7. Wat is het beleid bij een splanchnicus trombose?

Diagnostiek

- **Uitgangsvraag 1. Welk onderzoek is nodig bij de diagnose ET?**



Aanbevelingen

- Anamnese met aandacht voor algemene klachten, constitutionele symptomen (bij voorkeur met gebruik van Myeloproliferative Neoplasm-Symptom Assessment Form (MPN-SAF vragenlijst; Tabel 1),bloedingsneiging en cardiovasculaire risico factoren
- Lichamelijk onderzoek: bloeddruk, miltgrootte
- Bloedbeeld (inclusief leucocyten differentiatie), reticulocyten, kreatinine, leverenzymen, LDH,urinezuur, ferritine, CRP, glucose, cholesterol/triglyceriden
- Mutatie bepaling: *JAK2V617F* mutatie (VAF $\geq 1\%$), *BCR::ABL1* mutatie (ter uitsluiting CML) en bij een negatieve testuitslag *CALR* en *MPL* mutatie (eventueel bepalingen tegelijkertijd, afhankelijk van werkwijze moleculair laboratorium)
- Beenmergbiopsie (Tabel 2)
- **Op indicatie**
 - Echo milt bij twijfel over splenomegalie
 - In geval van verhoogde bloedingsneiging en/of indien trombocytose voorafgaand aan ingrepen met bloedingsrisico: sluit verworven von Willebrand type II uit middels bepaling van von Willebrand ristocetine activiteit en antigeen (verstoorde ratio <0.7)
 - Cytogenetisch onderzoek (bijvoorbeeld ter uitsluiting MDS) indien geen mutatiesaangetoond

[Tabel 1- MPN-SAF vragenlijst](#)

Tabel 2: Diagnostische criteria WHO 2022^{Khoury 2022}

Major criteria
<ol style="list-style-type: none">1. Trombocyten aantal $\geq 450 \times 10^9/l$2. BM biopsie met proliferatie van met name de megakaryocyttaire reeks met toename van aantal van vergrote, rijpe megakaryocyten met hyperlobulaire nuclei. Geen significante toename of links verschuiving in de neutrofiële granulopoïese of erythropoïese en zeer zelden beperkte toename (graad 1) van reticuline vezels.3. Uitsluiten van <i>BCR::ABL</i> CML, PV, PMF, MDS of andere myeloïde maligniteiten volgens de WHO criteria4. Aanwezigheid van <i>JAK2</i>, <i>CALR</i> of <i>MPL</i> mutatie
Minor criterium

<ul style="list-style-type: none"> o Aanwezigheid van een clonale marker of afwezig zijn van reactieve trombocytose
Diagnose ET
<ul style="list-style-type: none"> o 4 major criteria
<ul style="list-style-type: none"> o 1^e 3 major criteria en het minor criterium

Onderbouwing

Om de diagnose volgens WHO criteria te stellen is onderzoek van bloedbeeld en moleculair onderzoek noodzakelijk in combinatie met een beenmergonderzoek (Tabel 2). Hiermee kan een onderscheid gemaakt worden tussen ET en (pre-)fibrotische myelofibrose.^{Khoury 2022} Indien er bij bloedonderzoek alleen moleculaire driver mutatie (*JAK2*, *CALR*, *MPL* mutatie) gevonden is en er is een geïsoleerde trombocytose zonder indicatie voor het starten van cyto-reductieve therapie, kan overwogen worden het beenmergonderzoek uit te stellen.

Aangezien het risico op trombotische complicaties bij ET mede afhankelijk is van cardiovasculaire risicofactoren dienen deze bij diagnose bepaald te worden.^{Barbui 2018} Indien er een indicatie is voor het starten van cardiovasculair risico management programma kan dat ook via de huisarts plaatsvinden. Verworven von Willebrand ziekte type II (VvWD) kan voorkomen bij extreme trombocytose maar ook bij lagere trombocytentellingen, waarbij een verminderde ratio (<0,7) van von Willebrand ristocetine activiteit ten opzichte van von Willebrand antigeen het meest voorspellend is.^{Tiede 2011} De werkgroep adviseert daarom in geval van verhoogde bloedingsneiging en/of indien er ingrepen met hoog bloedingsrisico verricht gaan worden VvWD uit te sluiten. De ristocetine activiteit normaliseert indien trombocytentelling wordt teruggebracht.

Ook patiënten met ET hebben vaak klachten die de kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. Dit kan bij diagnose en follow-up vastgelegd worden met de MPN-SAF vragenlijst.^{Emanuel 2012}

Zoekverantwoording

Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, maar gebruik gemaakt van de World Health Organisation (WHO) classificatie, de Europese richtlijn (ELN) aangevuld met literatuur op basis van expertise van de richtlijnwerkgroep.

Referenties

- o Tiede 2011
- o Emanuel 2012
- o Barbui 2018
- o Khoury 2022

Prognosticering

- Uitgangsvraag 2. Welke (prognostische) risico groepen kunnen worden onderscheiden bij ET?



Aanbevelingen

- Inschatten risico op thrombo-embolische complicaties op basis van IPSET criteria (Tabel 3) (SORT B)

Tabel 3: IPSET criteria voor trombose risico ^{Barbui 2012}

Risico factor	HR	score
Leeftijd >60 jaar	1.50	1
Cardiovasculaire risicofactoren	1.56	1
Eerdere trombo-embolische complicatie	1.93	2
<i>JAK2V617F</i> mutatie	2.04	2
Laag risico score 0-1 Intermediar risico 2 Hoog risico \geq 3		

Onderbouwing

Patiënten met ET hebben een verhoogd risico op het optreden van trombo-embolische complicaties, veroorzaakt door meerdere factoren. Dit kan ingeschat worden met de IPSET criteria, waarbij ook deklassieke cardiovasculaire risicofactoren zoals roken, hypertensie, hypercholesterolemie en diabetes mellitus worden meegewogen (Tabel 3).^{Barbui 2012} Deze risico inschatting is met name behulpzaam indien er een afweging gemaakt moet worden tussen wel of niet starten van trombocytten aggregatieremming bij laag risico patiënten.

Aangezien het trombose risico met de leeftijd toeneemt, is de werkgroep, conform de ELN criteria, van mening dat alle patiënten ouder dan 60 jaar ongeacht de IPSET score behandeld moeten worden met trombocytten aggregatie remming en cytoreductieve therapie.^{Barbui 2018}

Zoekverantwoording

Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, maar gebruik gemaakt van de Europese richtlijn.

Referentie

- Barbui 2012, 2018

Stadiëring

- Uitgangsvraag 3. Wanneer is gebruik van trombocyten aggregatieremming geïndiceerd bij ET?



Aanbevelingen

- Alle patiënten met ET tenzij bloedingsneiging of VvWD: (SORT A)
 - acetylsalicylzuur 80mg/carbasalaatcalcium 100mg per
 - Indien er sprake is van klinische bloedingsneiging en/of VvWD (ratio van von Willbrand ristocetine activiteit ten opzichte van von Willebrand antigeen <0,7) dient dit eerst met cytoreductieve therapie behandeld te worden. (SORT A)
 - overwogen kan worden, voor een beter antitrombotisch effect, te kiezen voor een avond dosering i.p.v. een ochtend dosering (SORT C)
- Op indicatie: (SORT C)
 - indien patiënt <60 jaar en 0 punten bij IPSET, overweeg geen trombocytenuitremming

Onderbouwing

Vanwege het verhoogde risico op trombo-embolische complicaties is trombocytenuitremming (TAR) in principe bij alle patiënten geïndiceerd.^{Barbui 2018} Indien er sprake is van klinische bloedingsneiging en/of VvWD (ratio van von Willbrand ristocetine activiteit ten opzichte van von Willebrand antigeen <0,7) dient dit eerst met cytoreductieve therapie behandeld te worden. In geval van VvWD en een ristocetine activiteit <0,35% adviseert de werkgroep om trombocytenuitremming te staken en te hervatten na effectieve cytoreductieve therapie. Indien patiënt om andere redenen een verhoogd risico op bloedingen heeft, moet dit worden afgewogen tegen het risico op trombose. Hierbij kan de IPSET criteria voor trombose risico (Tabel 3) behulpzaam zijn. Bij patiënten een laag trombose risico hebben vanwege jonge leeftijd, zonder cardiovasculaire risicofactoren en zonder JAK2V617F mutatie kan overwogen worden geen trombocytenuitremming te starten.^{Barbui 2018} In een retrospectieve studie bij patiënten met CALR mutatie bleek een hogere incidentie op bloedingen en geen effect op trombose.^{Alvarez-Larrán 2016}

Beperkte data verkregen via een studie bij patiënten met essentiële trombocytose (ET) laten zien dat tweemaal daags doseren van TAR effectiever kan zijn in vergelijking met eenmaal daags doseren.^{Rocca 2020} Meerdaags doseren kan echter wel leiden tot meer bijwerkingen. De werkgroep adviseert om deze reden om vooralsnog niet om standaard tot een tweemaal daagse doseringsregime over te gaan. Daarnaast zijn er beperkte data die laten zien dat een avond dosering van TAR effectiever kan zijn dan een ochtend dosering. Deze data zijn gebaseerd op in vitro onderzoek verricht bij gezonde vrijwilligers (n=12) zonder klinische eindpunten.^{Racca 2019} Op grond van deze data is de werkgroep van mening dat overwogen kan worden een avond dosering te adviseren in plaats van een ochtend dosering.

Bij patiënten met een indicatie voor clopidogrel moet een inschatting gemaakt worden of dubbeltherapie met acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium opweegt tegen het bloedingsrisico van deze combinatie. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over clopidogrel monotherapie bij ET.

Zoekverantwoording

Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, maar gebruik gemaakt van de Europese richtlijn, de referentielijst van deze richtlijn en expertise van de richtlijnwerkgroep.

Referenties

- Alvarez-Larrán 2016
- Barbui 2018
- Racca 2019
- Rocca 2020

dan behaald worden?

Aanbevelingen

- Indicaties voor start cytoreductieve therapie en behandeldoel:
 - Leeftijd >60 jaar, streef trombocyten waarde <400 x10⁹/l (SORT B)
 - (doorgemaakt) trombo-embolische complicatie, streef trombocyten waarde <400 x10⁹/l (SORT B)
 - Trombocyten >1500 x10⁹/l of VvWD, streef verlagen trombocyten en/of remissie VvWD (SORT C)
 - Symptomatische splenomegalie, streef verminderen klachten splenomegalie (SORT C)
 - ET gerelateerde symptomen die niet verbeteren na start trombocytenaggregatieremming (SORT C)

Onderbouwing

Vanwege het verhoogde risico op trombo-embolische complicaties dat afhankelijk is van de leeftijd van de patiënt en zijn voorgeschiedenis, is het advies te starten met cytoreductieve therapie zodra patiënt 60 jaar wordt of indien er een trombo-embolische complicatie heeft plaatsgevonden. Het doel van de therapie is het verminderen van het risico op (nieuwe) trombo-embolische complicaties door bereiken van normale aantal trombocyten.^{Barbui 2018} Om het risico op bloedingen te verkleinen, dient cytoreductieve therapie plaats te vinden bij patiënten met trombocyten >1500 x10⁹/l of VvWD. Om het bloedingsrisico te verkleinen is normalisatie van trombocyten aantal niet per se noodzakelijk, zolang er complete remissie is van VvWD. Indien alleen trombocytose gerelateerde symptomen de reden zijn om te starten met therapie kan de laagst effectieve dosering cytoreductie gegeven worden. Indien er sprake is van splenomegalie bij ET bestaat een grote kans dat er overgang is naar post-ET myelofibroze en wordt BM biopt aanbevolen.

Zoekverantwoording

Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, maar gebruik gemaakt van de Europese richtlijn en expertise van de richtlijnwerkgroep.

Referentie

- Barbui 2018

Behandeling

- Uitgangsvraag 5. Welke cytoreductieve therapieën zijn geïndiceerd bij ET?



Aanbevelingen

- 1^e lijn: (SORT B)
 - Gepegyleerd interferon α 2a (Pegasys®), start dosering 45-90 microgram/week c., geleidelijk ophogen naar optimale dosis op basis van respons en bijwerkingen (90/135/180 microgram). Verlenging van het interval (2-4 weken) bij stabiele hematologische respons kan overwogen worden
 - Hydroxycarbamide, start dosering 1dd 500-1000mg oraal
- 2^e lijn:
 - Hydroxycarbamide, start dosering 1dd 500-1000mg oraal (SORT C)
 - Gepegyleerd interferon α 2a (Pegasys®), start dosering 45-90 microgram/week s.c., geleidelijk ophogen naar optimale dosis op basis van respons en bijwerkingen (90/135/180 microgram). Verlenging van het interval (2-4 weken) bij stabiele hematologische respons kan overwogen worden (SORT C)

- Anagrelide, start dosering 2dd 0,5mg, ieder week te verhogen met 0,5 mg/dag extra op geleide van trombocyten aantal. Maximale dosis 10 mg/dag en 2 mg/gift (SORT C)
- Combinatie van behandelingen
- Busulfan of melfalan, waarbij rekening gehouden moet worden met leukemogene effecten (bij voorkeur niet bij jongere patiënten toepassen)

Onderbouwing

Hydroxycarbamide en gepegyleerd interferon α worden beschouwd gelijkwaardige 1^e lijns behandelopties.^{Barbui 2018} Recente data in PV suggereren dat interferon een “disease modifying effect” heeft na langdurig gebruik, lopende studies bij ET met ropegintron alfa-2b zullen hierop een antwoord geven.^{Gisslinger 2020} Inmiddels heeft de European Medicines Agency (EMA) ropeginterferon alfa-2b (Besremi®) goedgekeurd als monotherapie voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van PV zonder symptomatische splenomegalie. Dit middel is echter niet voor de behandeling van ET geregistreerd.

De keus voor 1 van beide middelen is sterk afhankelijk van individuele patiënt factoren en wensen en dient door de behandelaar samen met de patiënt genomen te worden. Een recente publicatie toonde ook een beter effect van gepegyleerd interferon op de allelic burden aan in vergelijking met hydroxycarbamide behandeling.^{Mascarenhas 2023} Histopathologische beenmerg responsen werden echter met hydroxycarbamide behandeling vaker waargenomen in vergelijking met gepegyleerd interferon behandeling. In deze studie werd geen verschil in het optreden van trombo-embolische complicatie dan wel ziekte progressie waargenomen. Derhalve heeft de werkgroep geen duidelijke voorkeur voor behandeling met één van deze middelen, en zal de behandelkeuze tussen gebaseerd moeten worden op individuele patiëntfactoren. Hierbij dient tevens een hogere incidentie van non-melanoma huidmaligniteiten na langdurig hydroxycarbamide gebruik in de overweging te worden meegenomen.

Gezien het bijwerkingen profiel van gepegyleerd interferon α 2a kan een startdosering van 45 microgram/week s.c. verkozen worden boven een hogere startdosering. Het optimaliseren van de doseerfrequentie van gepegyleerd interferon α 2a (Pegasys®) hangt af van effectiviteit en ondervonden bijwerkingen. Verlenging van het interval (2-4 weken) bij stabiele hematologische respons kan overwogen worden. Indien patiënt intolerant is of onvoldoende respons heeft op behandeling is er uitgebreide keuze aan 2e lijns behandelingen.

Anagrelide is een goede 2^e lijns mogelijkheid voor patiënten die zowel op hydroxycarbamide als gepegyleerd interferon α onvoldoende respons hebben of de noodzakelijke dosering niet verdragen.^{Barbui 2018} Ruxolitinib is niet geregistreerd voor ET en er zijn onvoldoende gegevens om off-label gebruik te adviseren. Een gerandomiseerde fase 2 studie liet bijvoorbeeld geen voordeel zien van het gebruik van ruxolitinib versus best-available-therapie in de 2^e lijn.^{Harrison 2017}

Zoekverantwoording

Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, maar gebruik gemaakt van de Europese richtlijnen expertise van de richtlijnwerkgroep.

Referentie

- Harrison 2017
- Barbui 2018
- Gisslinger 2020
- Mascarenhas 2023

- **Uitgangsvraag 6. Wat is het therapeutisch beleid bij zwangere met ET?**



Aanbevelingen (SORT C)

- **Behandeling indien geen risicofactoren (zie tabel 4):**
 - Acetylsalicylzuur 80 mg/Carbasalaatcalcium 100 mg/dag
 - Hoog profylactische dosering laagmoleculair gewichtsheparine (LMWH) in het kraambed
 - Indien stijging trombocyten aantal $>1000 \times 10^9/l$ start gepegyleerd interferon α
- **Behandeling bij risicofactor(-en) (zie tabel 4):**
 - Acetylsalicylzuur 80 mg/Carbasalaatcalcium 100 mg/ dag
 - Start gepegyleerd interferon α , streef naar trombocyten $<400 \times 10^9/l$
 - Hoog profylactisch LMWH gedurende gehele zwangerschap en het kraambed Therapeutische dosering LMWH indien behandeling met orale antistollingstherapie voor de zwangerschap, anders profylactische dosering
 - Indien **alleen** de risicofactor tromboytose $>1000 \times 10^9/l$ aanwezig is, kan volstaan worden met hoog profylactische LMWH enkel in het kraambed (naast trombocyten aggregatie remming en cytoreductieve therapie)

Tabel 4: risicofactoren bij zwangerschap

Risicofactor
Trombose in voorgeschiedenis
Bloeding in voorgeschiedenis
Bij eerdere zwangerschap ≥ 3 spontane abortus binnen eerste trimester
Bij eerdere zwangerschap spontane abortus in tweede of derde trimester
Bij eerdere zwangerschap intra-uteriene sterfte
Bij eerdere zwangerschap pre eclampsie <37 weken, intra-uteriene groei achterstand of aanwijzingen voor placentadysfunctie
Bij eerdere zwangerschap bloeding of post-partum bloeding met transfusie noodzaak
Vooraf of tijdens huidige zwangerschap trombocyten $>1000 \times 10^9/l$

Onderbouwing

Zwangere patiënten met myeloproliferatieve ziektes hebben meer risico op het krijgen van complicaties van zowel moeder als kind. Het risico hierop kan ingeschat worden op basis van klassieke risicofactoren bij ET (zoals trombose, bloeding en trombocytose) en zwangerschap specifieke risicofactoren.^{Harrison 2011} (zie Tabel 4) Behandeling is erop gericht het risico te verkleinen door middel van geneesmiddelen die veilig geacht worden in de zwangerschap. In het kraambed dient tromboseprofylaxe middels hoog profylactisch LMWH gegeven te worden, tenzij er een indicatie is voor behandeling met

therapeutisch antistolling.

Zoekverantwoording

Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, maar gebruik gemaakt van een expert opinionartikel over dit onderwerp.

Referentie

- Harrison 2011

- **Uitgangsvraag 7. Wat is het beleid bij een splanchnische veneuze trombose?**



Aanbeveling

- Start cytoreductieve therapie indien trombocyten $>450 \times 10^9/l$ en streef bij behandeling naartrombocyten aantal $<400 \times 10^9/l$ (SORT B)
- Er geldt een levenslange indicatie voor therapeutische antistolling (tenzij contra-indicatie) (SORT C)
- Overweeg trombocyten aggregatieremming naast therapeutische antistolling indien laag bloedingsrisico en recidief trombose onder adequate antistolling (SORT C)
- DOACs in combinatie met cytoreductieve therapie verlagen het recidief trombose- en trombo-emboliserisico na recidief trombose evenals andere type van antistolling in combinatie met cytoreductieve therapie (SORT C)

Onderbouwing

Splanchnische veneuze trombose (SVT) is een veneuze trombo-embolie van een of meer van de abdominale venen (porta, lienalis, mesenterica, of supra-hepatische of intra-hepatische (Budd-Chiari syndroom) venen) en kan ernstige bloedingen als gevolg van portale hypertensie, splenomegalie en varices veroorzaken. Indien er sprake is van PV volgens de WHO criteria is er een indicatie voor cytoreductieve therapie op basis van het optreden van een trombo-embolische complicatie.^{Barbui 2018} In principe is er bij alle patiënten met SVT een indicatie voor therapeutische antistolling, maar dit dient afgewogen te worden tegen het risico op bloedingen.^{Riva 2012, Candeloro 2022} Bij SVT in het kader van een MPN heeft levenslange therapeutische antistolling (tenzij contra-indicatie) de voorkeur boven teruggaan op Acetylsalicylzuur 80 mg/Carbasalaatcalcium 100 mg/dag na de initiële periode van antistolling; een systematische review laat zien dat antistolling, in combinatie met cytoreductieve therapie, het recidief risico na trombose het meest effectief verlaagd.^{Hamulyak2021} Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om algemene aanbevelingen te doen over het toevoegen van trombocytenaggregatieremming naast therapeutische antistolling, aangezien vooral het bloedingsrisico hierdoor wordt vergroot. Bij de individuele patiënt kan dit overwogen worden in geval van een recidief trombose onder adequate antistollingstherapie en met afweging van risicofactoren voor bloeding. Ten aanzien van het gebruik van DOACs i.p.v. vitamine K antagonisten of LMWH kan het volgende gesteld worden: op basis van niet-gerandomiseerde studies lijken DOAC even effectief en veilig in het verlagen van het recidief risico na trombose als andere types antistolling (LMWH, VKA) en kunnen dus worden overwogen.^{Ageno 2022} Een duidelijke voorkeur voor het type antistolling is niet te geven, en dient per patiënt te worden afgewogen mede in afweging van hepatologische factoren.^{Ageno 2022, Candeloro 2022}

Zoekverantwoording

Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, maar gebruik gemaakt van de Europese richtlijn, een expert opinion artikel over dit onderwerp en expertise van de richtlijnwerkgroep.

Referenties

- Riva 2012
- Barbui 2018
- Hamulyak 2021
- Candeloro 2022
- Ageno 2022

Bijlagen

 [p548-f2 \(52 KB\)](#)  [0](#)