



**Let op: Deze richtlijn is geldig op de datum van afdruk. Raadpleeg steeds de meest recente versie via het officiële platform op de NVvH website**

PDF gemaakt op: 01-07-26 16:42

Initiatiefnemer: NVvH

Autorisatiedatum: 2023-07-14

Geautoriseerd door:

Landelijke Werkgroep van Hemoglobinopathie Behandelaren (LWHB)

## Richtlijninformatie

### Verantwoording

#### Onderwerp

De Landelijke Werkgroep van Hemoglobinopathie Behandelaren heeft het initiatief genomen een 'evidence-based' richtlijn te ontwikkelen voor het beleid bij thalassemie.

#### Doel

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en instructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk van de diagnostiek, behandeling en follow-up van thalassemie. Voorafgaande aan de ontwikkeling van de richtlijn zijn uitgangsvragen geformuleerd. Deze vragen volgen uit een knelpuntinventarisatie verricht bij medisch specialisten en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen het vakgebied als ook samen met patiënten (vertegenwoordigers). De meest relevante knelpunten zijn uitgewerkt tot uitgangsvragen. Dit betreft een aantal veelvoorkomende problemen in de dagelijkse praktijk rond het diagnostisch en therapeutisch beleid van patiënten met een thalassemie, zowel transfusie afhankelijk als transfusie onafhankelijk. De uitgangsvragen vormen de basis voor de verschillende modules van deze richtlijn.

De richtlijn beoogt derhalve niet een volledig leerboek te zijn. De richtlijn is bedoeld om aanbevelingen te geven, daar waar in de dagelijkse praktijk de belangrijkste knelpunten bestaan en tracht een betere uniformiteit van behandeling van deze patiënten in Nederland te bewerkstelligen, met name ook op die gebieden waar bewijs ontbreekt. Deze richtlijn is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek of consensus. Het niveau van bewijsvoering staat vermeld in de tekst.

#### Doelgroep

Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met een thalassemie.

#### Samenstelling werkgroep

De richtlijn is tot stand gekomen met medewerking van de volgende werkgroepleden die benoemd zijn en zitting hebben in de landelijke werkgroep hemoglobinopathie behandelaren (LWHB). De richtlijn is tot stand gekomen middels het raadplegen van de recente literatuur en het raadplegen van andere richtlijnen.

- Bart Biemond, internist-hematoloog Amsterdam Medische Centra, Amsterdam
- Harriët Heiboer, kinderhematoloog Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam Medische Centra, Amsterdam
- Jean-Louis Kerkhoffs, internist-hematoloog Haga Ziekenhuis, Den Haag
- Anja Mäkelburg, internist-hematoloog Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen
- Eva Rettenbacher, kinderhematoloog Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam Medische Centra, Amsterdam
- Anita Rijnveld, internist-hematoloog Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
- Saskia Schols, internist-hematoloog Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen
- Frans Smiers, kinderhematoloog Leids Universitaire Medisch centrum, Leiden

## Belangenverklaringen

Alle werkgroepleden hebben verklaard onafhankelijk gehandeld te hebben bij het opstellen van de richtlijn. Aan de werkgroepleden is gevraagd een belangenverklaring in te vullen, waarin ze hun banden met de farmaceutische industrie aangeven.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangen van bij de ontwikkeling van deze richtlijn betrokken personen.

Naam	Belangen
Bart Biemond, internist-hematoloog Amsterdam Medische Centra, Amsterdam	Medisch adviseur patiëntenvereniging OSCAR Nederland
Harriët Heiboer, kinderhematoloog Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam Medische Centra, Amsterdam	-
Jean-Louis Kerkhoffs, internist-hematoloog Haga Ziekenhuis, Den Haag	-
Anja Mäkelburg, internist-hematoloog Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen	-
Eva Rettenbacher, kinderhematoloog Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam Medische Centra, Amsterdam	-
Anita Rijnveld, internist-hematoloog Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam	Adviescommissies bij Novartis
Saskia Schols, internist-hematoloog Radboud universitair medisch centrum, Nijmegen	-
Frans Smiers, kinderhematoloog Leids Universitaire Medisch centrum, Leiden	Als deskundige door Bluebird betrokken geweest bij aanvraag vergoeding Zynteglo. Onbetaald.

## Methode ontwikkeling en werkwijze

Voor het vinden van relevante informatie is gebruik gemaakt van pubmed en andere internationale richtlijnen.

Er werd voor alle afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in de elektronische databases van Pubmed. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen en bestaande internationale richtlijnen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroep leden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van op voorhand opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module van de desbetreffende uitgangsvraag.

## Implementatie

De conceptrichtlijn is voor commentaar aangeboden aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en OSCAR Nederland. Het commentaar geeft input vanuit het veld om de kwaliteit en de toepasbaarheid van de richtlijn te optimaliseren en landelijk draagvlak voor de richtlijn te genereren. Alle commentaren werden vervolgens beoordeeld en verwerkt door de werkgroep. De richtlijn werd op 23 juni 2022 door de LWHB inhoudelijk vastgesteld. Ten slotte is de richtlijn ter autorisatie gestuurd naar OSCAR Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie.

In de verschillende fasen van de ontwikkeling van het concept van de richtlijn is zoveel mogelijk rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de aanbevelingen.

Om het gebruik in de dagelijkse praktijk te bevorderen wordt deze richtlijn verspreid onder de professionals van de bij de totstandkoming van deze richtlijn betrokken organisatie(s):

- Per mail naar de leden van de NVvH
- Publicatie (link naar) richtlijn op website NVvH

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. De richtlijn is/wordt digitaal verspreid onder alle relevante beroepsgroepen. Daarnaast is/wordt er een toelichting op de richtlijn aangeboden aan het tijdschrift voor Hematologie. Ook is de richtlijn te downloaden vanaf de website van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH): [www.hematologienederland.nl](http://www.hematologienederland.nl).

## Inbreng patientenperspectief

In deze richtlijn worden de patiënten vertegenwoordigd door een afgevaardigde van OSCAR Nederland. (patiëntenorganisatie voor dragers en patiënten met sikkelcelziekte en thalassemie)

## Samenvatting

### Algemeen

#### Overzicht uitgangsvragen

Diagnostiek en behandeling van thalassemie	
1.	Diagnostiek van thalassemie
2.	Monitoren orgaanschade
3.	Bloedtransfusie
4.	Ijzerstapeling en ontijzeringstherapie
5.	Endocriene complicaties en osteoporose
6.	Trombose
7.	Pulmonale hypertensie
8.	Ulcus cruris
9.	Fertiliteit, zwangerschap en counseling plaats
10.	Splenectomie
11.	Hydroxyurea bij thalassemie
12.	Stamceltransplantatie
13.	Nieuwe behandelmodaliteiten

### Uitgangsvraag 1 (Diagnostiek)

1. Wanneer is diagnostiek naar thalassemie geïndiceerd?

2. Welke diagnostiek is nodig om de diagnose  $\alpha$ -of  $\beta$ -thalassemie te stellen?

**Aanbeveling**

1. Bepaalde symptomatologie, een positieve familie anamnese, onbegrepen hemolyse of een microcytair bloedbeeld kunnen reden zijn voor het verrichten van diagnostiek naar thalassemie.
2. De meest gangbare technieken om  $\beta$ -thalassemie vast te stellen is de HPLC en capillaire elektroforese (EC) methoden. Met name ten behoeve van antenatale diagnostiek is aanvullende mutatie analyse geïndiceerd. Voor de diagnostiek van  $\alpha$ -thalassemie is altijd moleculaire diagnostiek aangewezen. In het algemeen kan volstaan worden met het bepalen van de 7 meest voorkomende deleties met GAP-PCR.

Conclusies	SORT Grade
De meest gangbare technieken om $\beta$ -thalassemie vast te stellen zijn de HPLC en capillaire elektroforese (EC) methode. Met name ten behoeve van antenatale diagnostiek is aanvullende mutatie analyse geïndiceerd.	A
Voor de diagnostiek van $\alpha$ -thalassemie is altijd moleculaire diagnostiek aangewezen. In het algemeen kan volstaan worden met het bepalen van de 7 meest voorkomende deleties met GAP-PCR.	A
De belangrijkste algemene lab parameters bij de diagnostiek van $\beta$ -thalassemie zijn:  Een microcytaire (MCV > 50 en < 70 tot max 80 fL), hypochrome (verlaagd MCH) anemie, met een verhoogd aantal reticulocyten en in de perifere rode cel uitstrijk schietschijf cellen, diverse andere vormafwijkingen en erytroblasten, zonder dat sprake is van een verlaagde ijzerstatus.	A
De belangrijkste algemene lab parameters bij de diagnostiek van $\alpha$ -thalassemie zijn:  Een microcytaire (MCV > 50 en < 70 tot max 80 fL), hypochrome (verlaagd MCH) anemie, met een verhoogd aantal reticulocyten.	A

**Onderbouwing**

**Introductie**

Er zijn diverse fysiologische vormen van hemoglobine. De aanwezigheid van deze vormen kan verschillen per leeftijd en per individu.

In de postnatale situatie zijn deze vormen: HbA (bestaande uit 2  $\alpha$ - en 2  $\beta$  - ketens), HbA<sub>2</sub> (2  $\alpha$ - en 2  $\delta$ -ketens) en HbF (2  $\alpha$ - en 2  $\gamma$ - ketens).

In de fysiologische situatie bevatten de rode bloedcellen van een volwassene ongeveer 97-98% HbA, 2-3% HbA<sub>2</sub> en een minimale hoeveelheid HbF en van een pasgeborene ongeveer 70 -95% HbF, 5-30% HbA en < 1% HbA<sub>2</sub>.

Gedurende het eerste levensjaar neemt de expressie van het HbF af en wordt in de fysiologische situatie geleidelijk aan vervangen door HbA expressie.

**Thalassemie**

Bij thalassemie is sprake van verminderde of afwezige globine keten productie.


Afhankelijk van de verminderde of afwezige productie van het soort keten, is bijvoorbeeld sprake van  $\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ -,  $\delta$ -thalassemie of combinaties hiervan.

De belangrijkste vormen van thalassemie zijn  $\alpha$ - en  $\beta$ -thalassemie. Deze erven autosomaal recessief over en de ernst van het ziektebeeld kan uitgedrukt worden als klinisch beeld (fenotype) of als genotype (soort mutatie).

Mensen met een heterozygote genetische variant van  $\alpha$ - of  $\beta$ -thalassemie zijn veelal asymptomatisch en behoeven geen behandeling.

Mensen met een homozygote of samengesteld heterozygote genetische thalassemie variant, vertonen in wisselende mate klinische expressie, waarvan bloedarmoede de belangrijkste is.

Tegenwoordig spreken we van TDT (transfusie afhankelijke thalassemie) en NTDT (niet- transfusie afhankelijke thalassemie) (zie Figuur 1).




Figuur 1: Spectrum van de thalassemie syndromen.

### Diagnostiek van $\beta$ -thalassemie

Normaal gesproken heeft een individu één actief  $\beta$ -gen op elke kopie van chromosoom 11. Er zijn tot op heden meer dan 200 mutaties in het  $\beta$ -gen beschreven, aanleiding gevend tot variabele klinische expressie. Een  $\beta^0$ -mutatie houdt in dat er geen enkele expressie door het betreffende gen plaatsvindt en dus geen  $\beta$ -globine productie. Een  $\beta^+$ -mutatie houdt in dat er verminderde expressie door het betreffende gen plaatsvindt en dus verminderde  $\beta$ -globine productie (rond 10%). Bij  $\beta^{++}$ -mutaties is de verminderde productie erg mild.

De belangrijkste algemene laboratorium bevindingen bij  $\beta$ -thalassemie zijn (zie ook Figuur 2): Een microcytaire (MCV > 50 en < 70 tot max 80 fL), hypochrome (verlaagd MCH) anemie, met een verhoogd aantal reticulocyten en in de perifere rode cel uitstrijk schietschijf cellen, diverse andere vormafwijkingen en erytroblasten, zonder dat sprake is van een verlaagde ijzerstatus.



Figuur 2. Stroomdiagram diagnostisch proces voor hemoglobinopathie en dragerschap hiervan.

Hemoglobine analyse met kwantitatieve technieken dient ingezet te worden ter diagnostiek en bestaat uit:

- High Performance Liquid Chromatography (HPLC) of capillaire elektroforese (CE). Een afwijkend patroon dient bevestigd te worden met een tweede techniek. De moleculaire technieken die hiertoe het meest worden toegepast zijn Sanger sequencing (puntmutaties), gap-PCR en MLPA (deleties), of NGS.

Met deze kwantitatieve technieken wordt de hoeveelheid en type aanwezig hemoglobine bepaald.

Bij kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen met homozygote  $\beta^0$ -thalassemie is er geen aanwezigheid van HbA, een verhoogd gehalte HbA<sub>2</sub> en sprake van een HbF gehalte tussen 92 en 95%.

Voor pasgeborenen met homozygote  $\beta^0$ -thalassemie geldt: geen HbA, HbF > 95%, HbA<sub>2</sub> < 2.5%.

Bij kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen met homozygote  $\beta^+$ -thalassemie of samengestelde  $\beta^+/\beta^0$ -mutaties, is het HbA gehalte tussen 10 en 30%, de HbA<sub>2</sub> waarde verhoogd en de HbF waarde tussen 70 en 90%.

Voor pasgeborenen met deze intermedia vormen geldt: HbA < 5%, HbF > 95% en HbA<sub>2</sub> < 2.5%.

#### Moleculaire analyse

Aanvullende moleculaire analyse is in het algemeen niet noodzakelijk voor het stellen van de juiste diagnose, maar kan in sommige gevallen zeker van diagnostische waarde zijn. In geval van prenatale diagnostiek is dit noodzakelijk om vast te kunnen stellen of het ongeboren kind al dan niet aangedaan is.

Veel voorkomende mutaties kunnen met PCR technieken vastgesteld worden. Als met deze gerichte mutatie analyse geen mutatie aangetoond kan worden, kan het aangewezen zijn om  $\beta$ -globine gen sequentie analyse uit te voeren.

#### Genotype-fenotype correlatie

De disbalans in globine ketens ( $\alpha$ - versus  $\beta$ -ketens) vormt een belangrijke determinant van de ernst van het klinisch beeld van de  $\beta$ -thalassemie. Om deze reden zijn factoren die deze disbalans verminderen, mede bepalend voor het fenotype. Zo draagt een bijkomende  $\alpha$ -thalassemie bij aan een vermindering van de ernst van de anemie. Ook mutaties (o.a. de HPFH mutatie) die aanleiding geven tot verhoogde productie van  $\gamma$ -ketens, hebben een dergelijk gunstig effect.

Aan de andere kant kan het fenotype in negatieve zin worden beïnvloed door de aanwezigheid van een toegenomen keten disbalans door toename van  $\alpha$ -ketens als gevolg van een toegenomen aantal functionele  $\alpha$ - globine genen (triplicatie of quadruplicatie).

#### Diagnostische workup $\beta$ -thalassemie in samenvatting

- Volledig bloedbeeld, inclusief reticulocyten en rode cel indices (MCV, MCH)
- IJzerstatus
- Hemoglobine analyse met kwantitatieve (of eventueel kwalitatieve) techniek
- Op specifieke indicatie aanvullende moleculaire analyse

#### Diagnostiek van $\alpha$ -thalassemie

Normaal gesproken heeft elk individu 4  $\alpha$ -genen ( 2 gedupliceerde  $\alpha$ -genen op 2 loci) op de korte arm van chromosoom 16.

In tegenstelling tot  $\beta$ -thalassemie, wordt bij  $\alpha$ -thalassemie de verminderde of afwezige synthese van de ketens veelal veroorzaakt door deleties, optredend in het  $\alpha$ -globine gen cluster op chromosoom 16. Er zijn ruim 125 verschillende moleculaire defecten beschreven die  $\alpha$ -thalassemie kunnen veroorzaken, die sterk in grootte verschillen. De meest voorkomende deleties zijn de South East Asian (-SEA) deletie, die 2  $\alpha$ -genen betreft en de 4.2 en 3.7 kb-deleties.

De verschillende  $\alpha$ -thalassemie fenotypes zijn het gevolg van het ontbreken van één ( $\alpha^+$ -thalassemie) of beide ( $\alpha^0$ -thalassemie)  $\alpha$ -globine genen op elk van de beide loci.

De belangrijkste algemene laboratorium bevindingen bij de klinisch belangrijke vormen van  $\alpha$ -thalassemie (HbH ziekte) zijn (zie ook Figuur 2):

- Een microcytaire (MCV > 50 en < 70 tot max 80 fL), hypochrome (verlaagd MCH) anemie, met een verhoogd aantal reticulocyten.

#### Moleculaire analyse

Voor het stellen van de diagnose  $\alpha$ -thalassemie is moleculaire diagnostiek aangewezen. In veel laboratoria beperkt deze diagnostiek zich tot de 7 meest voorkomende deleties, die met behulp van GAP-PCR vastgesteld kunnen worden. Bij persisterende verdenking op  $\alpha$ -thalassemie na uitsluiten van deze deleties, kan uitgebreidere moleculaire diagnostiek met  $\alpha$ -gen sequencing of MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification) verricht worden in daartoe gespecialiseerde laboratoria. Ter opsporing van de non-deletionele vormen, die ook oorzaak kunnen zijn van instabiliteit van de  $\alpha$ -ketens, wordt vaak de techniek van geautomatiseerde Direct-Sequencing technieken volgens Sanger gebruikt.

HbH ziekte is de klinisch belangrijkste vorm van  $\alpha$ -thalassemie en kan het gevolg zijn van het ontbreken van 3  $\alpha$ -genen of van een combinatie van deletionele en non-deletionele mutaties, waarvan Hb Constant Spring de meest voorkomende is (zie Tabel 1). De non-deletionele vorm van HbH ziekte is geassocieerd met een ernstiger fenotype.

Ook kunnen extra  $\alpha$ -genen een  $\beta$ -thalassemie intermedia fenotype veroorzaken bij dragers van  $\beta$ -thalassemie. Alfa-triplicatie (de anti alfa 3.7) kan via een PCR gebaseerde methode worden aangetoond of d.m.v. MLPA.

Tabel 1. Genotype-fenotype correlatie bij  $\alpha$ -thalassemie

Fenotype	Genotype	Kliniek/bloedbeeld
Silent carrier	$\alpha^0\alpha/\alpha\alpha$	Asymptomatisch Geen hematologische afwijkingen
Drager/minor	$\alpha^0\alpha/\alpha^0\alpha$ $\alpha^0\alpha^0/\alpha\alpha$	Milde asymptotische anemie Microcytose en hypochromie
Deletionele HbH ziekte	$\alpha^0\alpha^0/\alpha^0\alpha$	Milde tot matige anemie Niet-transfusie afhankelijk Kliniek varieert van minor tot major
Non-deletionele HbH ziekte	$\alpha^0\alpha^0/\alpha^T\alpha$	Matige tot ernstige anemie Kan incidentele of frequente transfusies nodig hebben

Major (HbBart's hydrops foetalis)	$\alpha^0\alpha^0/\alpha^0\alpha^0$	De meesten ontwikkelen hydrops foetalis en overlijden intrauterien of kort post partum Indien overleving (antenatale transfusies), dan transfusie afhankelijk
-----------------------------------	-------------------------------------	--

De 'T' staat voor een non-deletionele  $\alpha$  keten mutatie, zoals Hb Constant Spring

Bij pasgeborenen kan HbH ziekte vermoed worden door het aantonen met Hb-typering (o.a. met HPLC) van HbBart's. HbBart's bestaat uit 4  $\gamma$ -ketens en ontstaat in afwezigheid van voldoende  $\alpha$ -ketens. Dit HbBart's verdwijnt echter snel na de geboorte. HbBart's van rond 25% bij een pasgeborene suggereert de aanwezigheid van HbH ziekte.

Op latere leeftijd kan bij Hb-typering HbH (4  $\beta$ -ketens) aangetoond worden, echter dit is niet bij alle patiënten met  $\alpha$ -thalassemie aanwezig.

HbBart's hydrops foetalis wordt veroorzaakt door de deletie van alle 4  $\alpha$ -genen en is in principe niet met het leven verenigbaar (tenzij het kind antenataal en reeds vroeg in de zwangerschap bloedtransfusies ontvangt). Indien een kind met HbBart's overleeft, dan zal het ook postnataal transfusie afhankelijk blijven.

#### Genotype-fenotype correlatie

De mate van anemie is verschillend voor de diverse vormen van HbH ziekte: bij de deletionele vorm variërend tussen 4.3 en 6.6 mmol/L; bij de non-deletionele vorm tussen 2.4 en 5.4 mmol/L.

#### Diagnostische workup $\alpha$ -thalassemie in samenvatting

- Volledig bloedbeeld, inclusief reticulocyten en rode cel indices (MCV, MCH)
- IJzerstatus
- Moleculaire analyse
- Bij hemoglobine analyse met kwantitatieve techniek kunnen er bevindingen zijn die de aanwezigheid van  $\alpha$ -thalassemie doen vermoeden (zoals de aanwezigheid van HbH of HbBart's of een verlaagd HbA2 gehalte)

#### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

#### Referenties

- Cappellini et al. Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT), 3<sup>rd</sup> Edition 2017.
- Taher et al. Guidelines for the Management of Non Transfusion Dependent Thalassaemia (NTDT), 2<sup>nd</sup> Edition 2017.
- Werkboek Kinderhematologie: <https://hematologienederland.nl/kwaliteit/werkboek-kinderhematologie/>
- Hartevelde CL et al. Laboratoriumdiagnostiek van hemoglobinopathie: toelichting op de aanbeveling 2023. Ned Tijdschr Hematol 2023; 20:92-99.
- van Delft et al, International Journal of Laboratory Hematology, 2009; vol 31-5, P 484-495
- [pdf \(de-vhl.nl\)](#)

## Uitgangsvraag 2 (Monitoren orgaanschade)

Welke onderzoeken zijn in welke frequentie nodig om orgaanschade bij patiënten te detecteren?

#### Aanbeveling

Het schema is een aanbeveling in welke frequentie screeningsonderzoeken moeten worden gedaan. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen het eerste consult en poliklinisch vervolggconsult. De frequentie van de onderzoeken kan aangepast worden indien sprake is van orgaanschade.

Basisdiagnostiek eerste consult
Hb, MCV, leukocyten, trombocyten, reticulocyten Hb typering (HPLC), alfa-thalassemie onderzoek, DNA-diagnostiek
Bilirubine (direct/totaal), LDH, kreatinine, ASAT, ALAT, AF en $\gamma$ GT, ferritine/transferrinesaturatie (TSAT) Indien verdenking ijzerstapeling: FT4, TSH, LH, FSH, IGF1, testosteron
Parvovirus B19 virusserologie Hepatitis B, C HIV
Indien verdenking ijzerstapeling: MRI T2*lever en hart, overweeg cortisol, OGTT/nuchtere glucose, HbA1c (zie ook endocriene complicaties)
Genetische counseling (bij voorkeur verwijzing naar klinisch geneticus)

Follow up monitoring	Eerste keer op leeftijd van	Frequentie
Hb, MCV, leukocyten, trombocyten, reticulocyten	6 maanden	2x/jaar
Uitgebreide bloedgroep typering	Indien transfusieafhankelijk	Eenmalig
Bilirubine (direct/total), LDH, ferritine, transferrine verzadiging (TSAT)	6 maanden	2x/jaar
Foliumzuur, vitamine B12	1 jaar	1x/jaar
ALAT, ASAT, AF, γGT, glucose	1 jaar	1x/jaar
Kreatinine	1 jaar	2x/jaar
Parvo B19 serologie	5 jaar	1x/5 jaar (indien)
Bloeddruk	5 jaar	1x/jaar
ECG	Eenmalig op 15 jaar	Op indicatie
Echo cor (1)	15 jaar	1x/3 jaar, bij af
Echo abdomen	Eenmalig op 15 jaar	o.i.
Urineportie op microalbumine, microalbumine/kreat ratio	Vanaf 10 jaar	1x/jaar
botdensitometrie	Vanaf 18 jaar of eerder op indicatie	1x/2-3 jaar
MRI T2* van hart en lever	Voorkeur vanaf 6-8ste levensjaar, anders onder narcose	1x/2 jaar
HLA typering		indien allogene

zie ook monitoring endocriene parameters

<sup>1</sup> Echocardiografie (dimensies ventriculi en atria, diastolische functie, PAP druk, LV en RV ejectiefractie, pieksnelheid tricuspidalisklep (TRV) in verband met pulmonale hypertensie).

Extra monitoring bij chelatietherapie	
Bloedbeeld	4x/jaar
Ferritine	4x/jaar
Zink, calcium, geïoniseerd calcium, magnesium, koper, fosfaat, glucose, vitamin D	1x/jaar
Kreatinine	4x/jaar
Urine; eiwit en microalbumine	1x/jaar
ASAT, ALAT, AF, γGT, bilirubine	4x/jaar
FT4, T3, TSH, IGF1, testosteron, PTH	1x/ 2 jaar indien inadequate ontijzering
Audiogram/ICC oogheelkunde	1x/jaar
MRI T2*	Bij start ijzerchelatietherapie en indien afwijkend, 1x/2 jaar. NTDT <a href="#">jaarlijks MRI T2*</a>

#### Onderbouwing

De levensverwachting van patiënten met thalassemie (excl. dragers) is beperkt als gevolg van orgaanschade door met name ijzerstapeling. Door systematische screening kan orgaanschade in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd en kunnen preventieve maatregelen worden genomen. Dit vormt de reden dat bij alle patiënten met thalassemie systematische screening op secundaire orgaanschade dient plaats te vinden.

Patiënten met niet transfusie afhankelijke thalassemie kunnen zowel osteoporose als ijzerstapeling ontwikkelen en screening middels ferritine en transferrine saturatie (TSAT) volstaat niet (Taher BJH 2010, Barcellini BJH 2019, Beers 2019). Om die reden is het advies ook bij deze patiënten regelmatig bloed- en beeldvormend onderzoek te doen naar orgaanschade (zie tabel). Vijftig procent van patiënten met TDT en NTDT ontwikkelt osteoporose (De-sanctis et al. 2018, Metabolism)). Met zelfs nog een hoger voorkomen bij mannen. Het fractuurrisico in TDT/NTDT lijkt zelfs 30-50% te zijn weliswaar betreft dit studies van oudere datum en mogelijk met inadequate ijzerchelatie (1985 A.Finsterbush et al., Clin Orthop).

#### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen

#### Referenties

- Barcellini W, Zaninoni A, Gregorini AI, Soverini G, Duca L, Fattizzo B, Giannotta JA, Pedrotti P, Vercellati C, Marcello AP, Fermo E, Bianchi P, Cappellini MD. Iron overload in congenital haemolytic anaemias: role of hepcidin and cytokines and predictive value of ferritin and transferrin saturation. Br J Haematol. 2019 May;185(3):523-531.
- Cappellini MD, Farmakis D, Porter J and Taher A. Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT) 4<sup>th</sup> edition 2021. Publishers Thalassaemia International Federation.
- Finsterbush A, Farber I, Mogle P, Goldfarb A. Fracture patterns in thalassaemia. Clin Orthop Relat Res. 1985 Jan-Feb;(192):132-6.
- Shah FT, Porter JB, Sadasivam N, Kaya B, Moon JC, Velangi M, Ako E, Pancham S. Guidelines for the monitoring and management of iron overload in patients with haemoglobinopathies and rare anaemias. Br J Haematol. 2022 Jan;196(2):336-35.
- van Straaten S, Biemond BJ, Kerkhoffs JL, Gitz-Francois J, van Wijk R, van Beers EJ. Iron overload in patients with rare hereditary hemolytic anemia: Evidence-based suggestion on whom and how to screen.
- Taher AT, Musallam KM, Karimi M, El-Beshlawy A, Belhoul K, Daar S, Saned M, Cesaretti C, Cappellini MD. Age-related complications in treatment-naïve patients with thalassaemia intermedia. Br J Haematol. 2010 Aug;150(4):486-9. Am J Hematol. 2018 Nov;93(11):E374-E376.
- Taher A, Vichinsky E, Cappellini MD, Viprakasit V. Guidelines for the Management of Non Transfusion Dependent Thalassaemia (NTDT), 2<sup>nd</sup> edition 2017. Publishers Thalassaemia International Federation.

## Uitgangsvraag 3 (bloedtransfusie)

1. Wat zijn de indicaties voor erythrocytentransfusie bij een patiënt met thalassemie?
2. Wat zijn de pre-transfusie streefwaarden voor chronische erythrocytentransfusie bij een patiënt met thalassemie?
3. Welke matching van bloedgroepantigenen dient te worden nagestreefd?
4. Is Parvo B19-veilig bloed geïndiceerd?

### Aanbevelingen

1.
  - a. Het absolute hemoglobine-gehalte is geen indicatie om transfusie te initiëren, tenzij het een anemie (Hb <3.1 mmol/l) betreft.
  - b. Start bij patiënten met een bewezen thalassemie met chronische transfusiebehandeling bij een absoluut Hb gehalte <4.3mmol/l op 2 opeenvolgende meetmomenten die >2 weken uit elkaar liggen in afwezigheid van andere mogelijk verklarende factoren voor de anemie (infectie, etc.)
  - c. geef transfusie bij een Hb gehalte >4.3 mmol/l in combinatie met een of meerdere van de volgende symptomen: verandering van de ossale gezichts-structuren, groeiretardatie, fracturen, klinisch significante extramedullaire hematopoëse
  - d. Geef incidenteel transfusie bij een NTDT-patiënt bij verergering van de anemie in kader van infectie of trauma die gepaard gaat met bijbehorende symptomatologie en profylactisch in kader van chirurgie of zwangerschap.
2. Streef bij TDT-patiënten een pre-transfusie-Hb van 5.5 mmol/L (en bij cardiovasculaire comorbiditeit 6.5 mmol/l) na.
3. Selecteer voor patiënten met thalassemie en frequente transfusiebehoefte Rh fenotype en K compatibel bloed ter voorkoming van de vorming van alloantistoffen.
4. Typeer transfusie-afhankelijke patiënten met thalassemie zo vroeg mogelijk voor de bloedgroepantigenen van het Rh, Kell, Duffy, Kidd en MNS-systeem (de S en s antigenen en eventueel voor het M antigeen typeren).
  - a. Geef aan thalassemie-patiënten zonder antistoffen tegen het Parvo B19-virus Parvo B19-veilige bloedproducten.
  - b. Test Parvo B19 IgG-negatieve patiënten jaarlijks op aanwezigheid van antistoffen hiertegen totdat een patiënt deze heeft ontwikkeld.

Conclusie	SORT Grade
Start in patiënten met een bewezen thalassemie met chronische transfusiebehandeling bij een Hb <4.3 mmol/l op 2 opeenvolgende meetmomenten die >2 weken uit elkaar liggen in afwezigheid van andere mogelijk verklarende factoren voor de anemie (infectie, etc.) (Capellini 2014)	C
geef transfusie bij een Hb >4.3 mmol/l in combinatie met een of meerdere van de volgende symptomen: verandering van de ossale gezichts-structuren, groeiretardatie, fracturen, klinisch significante extramedullaire hematopoëse (Taher 2017)	C
Geef incidenteel transfusie bij een NTDT-patiënt bij verergering van de anemie in kader van infectie of trauma en profylactisch in kader van chirurgie of zwangerschap (Taher 2017)	C
Streef bij TDT-patiënten een pre-transfusie-Hb van 5.5 mmol/L (en bij cardiovasculaire comorbiditeit 6.5 mmol/l) na (Capellini 2014)	C
Bij getransfundeerde thalassemie patiënten wordt een verhoogde prevalentie van allo-antistoffen gericht tegen antigenen van het Rhesus- en Kell-systeem (Zaidi 2015, Franchini 2019)	B
Selecteer voor patiënten met thalassemie en frequente transfusiebehoefte Rh fenotype en K compatibel bloed ter voorkoming van de vorming van alloantistoffen. (Richtlijn Bloedtransfusie 2020)	C

Typeer transfusie-afhankelijke patiënten met thalassemie zo vroeg mogelijk voor de bloedgroepantigenen van het Rh, Kell, Duffy, Kidd en MNS-systeem (de S en s antigenen en eventueel voor het M antigeen typeren). (Richtlijn Bloedtransfusie 2020)	C
Bij parvo B19-IgG-negatieve thalassemie-patiënten bestaat de voorkeur voor het geven van Parvo B19-veilige bloedproducten. (Lefrere 1986)	C

De TIF-richtlijn beveelt aan om bij kinderen (uitgaande van een RBC-hematokriet van 60%, zoals bij de in NL verkrijgbare RBC's) 10 ml/kg te transfunderen om het Hb 1,24 mmol/l te laten stijgen en 15 ml/kg om het Hb om 1,86 mmol/l te laten stijgen. Dat is lager dan de doorgaans bij kinderen geadviseerde 15-20 ml/kg.

Bij volwassenen wordt initieel van een stijging van het Hb om ca 0,5 mmol/l per RBC uitgegaan als geen eerdere transfusie-opbrengsten bekend zijn. Indien opbrengsten van eerdere transfusies bekend zijn wordt aanbevolen om hiermee rekening te houden, aangezien de opbrengst kan verschillen afhankelijk van het circulerend bloedvolume.

#### Onderbouwing

Door de ineffektieve hemoglobine-synthese bij patiënten met beta-thalassemie is er sprake van een verkorte overleving van erythrocyten door hemolyse en premature afbraak van erythrocytaire voorlopers in het beenmerg (Weatherall 2001). De hierdoor ontstane chronische anemie kan onder andere beenmergexpansie, hepatosplenomegalie, groeiretardatie of hartfalen ten gevolge hebben (Capellini 2014, Taher 2017, Taher 2021). Erythrocytentransfusies corrigeren de anemie, voorkomen beenmerghyperplasie en hepatosplenomegalie, ondersteunen normale groei en dagelijkse activiteiten en verbeteren de kwaliteit van leven, indien deze transfusies op een chronische basis gegeven worden (Capellini 2014, UK Thalassaemia Society 2016, Taher 2017, Taher 2021).

In de drie studies onder patiënten met thalassemie varieert de prevalentie van alloimmunisatie van 2 tot 11%, indien alleen ABO, RhD gematcht is (Lal 2018, Richtlijn Bloedtransfusie 2020). Het betreffen met name Rh en K-alloantistoffen. Het wordt aangenomen dat het immunisatierisico bij thalassemie-patiënten lager ligt dan bij de groep patiënten met sikkelcelziekte. De onderliggende ziekte, de leeftijd waarop gestart is met transfusie, de transfusiefrequentie, die per type thalassemie kan verschillen, of minder grote verschillen in bloedgroepantigeentyperingen tussen patiënten en donors kunnen een verklaring zijn voor de lagere prevalentie van alloimmunisatie bij deze groep patiënten met thalassemie. De Richtlijn bloedtransfusie 2020 adviseert dan ook om enkel voor Rhesus en Kell gematcht donorbloed te selecteren en niet preventief voor andere erythrocyten-antigenen te matchen (Richtlijn Bloedtransfusie 2020).

Naast het uityperen voor de RhCcEe en K bloedgroepantigenen dienen transfusie-afhankelijke patiënten met thalassemie zo mogelijk, bij voorkeur voor de eerste transfusie, ook uitgetypeerd te worden voor de bloedgroepantigenen van het Duffy, Kidd en MNS-systeem (M, S en s antigenen) (Richtlijn Bloedtransfusie 2020).

Bij sommige groepen patiënten kan het Parvo B19 virus voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen. Onder andere werd bij patiënten met thalassemie een aplastische crisis ten gevolge van een infectie met Parvo B19 beschreven (Lefrere 1986). Derhalve is het advies om o.a. patiënten met een thalassemie bij afwezigheid van Parvo B19 IgG-antistoffen Parvo B19 veilig bloed te geven (Gezondheidsraad, 2002). Als een patiënt IgG-antistoffen tegen dit virus heeft kan ervan uitgegaan worden dat er geen herinfectie kan optreden en hoeven er geen Parvo veilige transfusies meer gegeven te worden.

#### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

#### Referenties

- Cappellini MD, Cohen A, Porter J, Taher A, Viprakasit V. Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT). 4th ed (Version 2.0). Nicosia, Cyprus: Thalassaemia International Federation, 2021.
- Franchini M, Forni GL, Marano G, Cruciani M, Mengoli C, Pinto V, De Franceschi L, Venturelli D, Casale M, Amerini M, Capuzzo M, Grazzini G, Masiello F, Pati I, Veropalumbo E, Vaglio S, Pupella S, Liumbruno GM. Red blood cell alloimmunisation in transfusion-dependent thalassaemia: a systematic review. Blood Transfus. 2019 Jan;17(1):4-15.
- Signalement "Bloedproducten en Parvovirus B19" Gezondheidsraad 2002, publicatie nr. 2002/07. Website: <https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2002/05/30/bloedproducten-en-parvovirus-b19-signalement>
- Lal A, Wong TE, Andrews J, et al. Transfusion practices and complications in thalassaemia. Transfusion 2018;58:2826-35.
- Lefrere JJ, Courouce AM, Girot R, Cornu P. Human parvovirus and thalassaemia. J Infect. 1986 Jul;13(1):45-9.
- Richtlijn Bloedtransfusie 2020 [https://richtlijnen database.nl/richtlijn/bloedtransfusiebeleid/startpagina\\_-\\_bloedtransfusiebeleid.html](https://richtlijnen database.nl/richtlijn/bloedtransfusiebeleid/startpagina_-_bloedtransfusiebeleid.html)
- Taher A, Musallam K, Cappellini MD. Guidelines for the management of non transfusion dependent thalassaemia (NTDT). Nicosia, Cyprus: Thalassaemia International Federation, 2017.
- Taher AT, Musallam KM, Cappellini MD.  $\beta$ -Thalassaemias. N Engl J Med. 2021 Feb 25;384(8):727-743.
- United Kingdom Thalassaemia Society. Standards for the clinical care of children and adults with thalassaemia in the UK. 3rd ed. 2016 Available from: [www.ukts.org/standards/Standards-2016final.pdf](http://www.ukts.org/standards/Standards-2016final.pdf)
- Weatherall DJ. Phenotype-genotype relationships in monogenic disease: lessons from the thalassaemias. Rev. Genet. 2001;2:245-55

## Uitgangsvraag 4 (IJzerstapeling en ontijzerings therapie)

1. Hoe wordt de mate van ijzerstapeling in kaart gebracht?
2. Wanneer en hoe wordt ijzerstapeling behandeld?

#### Aanbevelingen

1. Verricht een MRI T2\* en bepaal de LIC waarde (lever) en T2\* waarde (hart) om de mate van ijzerstapeling zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.
2. Start ontijzerings therapie bij TDT patiënten vanaf een cumulatieve bloedtransfusie aantal > 20-25 eenheden of een LIC waarde  $\geq 3$  mg/g drooggewicht lever Fe. Start ontijzerings therapie bij NTDT patiënten  $\geq 10$  jaar bij een LIC waarde  $\geq 5$  mg/g drooggewicht lever FE of een serum ferritine waarde van  $\geq 800$  ng/ml en/of TSAT van >45%.

Behandeling ziet er als volgt uit:

- A. Start bij TDT patiënten met monotherapie deferasirox. Een alternatieve keuze is deferoxamine of deferipron.
- B. Start bij cardiale ijzerstapeling deferipron, eventueel later gevolgd door combinatie met deferoxamine.
- C. Geef bij NTDT patiënten met ijzerstapeling deferasirox monotherapie.
- D. In geval van acuut hartfalen bij ernstige ijzerstapeling in het hart, wordt continue infusie met deferoxamine geadviseerd in combinatie met een standaarddosering deferipron.

#### Onderbouwing

##### Inleiding

Ijzerstapeling treedt op door een dysbalans tussen het ijzer dat het lichaam binnenkomt en weer wordt uitgescheiden of verbruikt. Het lichaam heeft van nature geen fysiologisch mechanisme om een overschot aan ijzer uit te scheiden. Een overschot aan ijzer in het lichaam leidt tot schade aan veel organen, met als gevolg hartfalen, cirrose, groeiachterstand en meerdere endocrinopathieën (2014).

Conclusie	SORT Grade
<p>1a. De meest accurate inschatting van de ijzerstatus wordt verricht door het meten van de liver iron content (LIC) afkomstig van een MRI scan.(Wood and Ghugre 2008)</p> <p>Bij alle patiënten met een NTDT &gt;10 jaar dient de ijzerstatus frequent gemonitord te worden. (Taher, Musallam et al. 2010, Musallam, Cappellini et al. 2012)</p>	B
<p>1b. Het serum ferritine is een marker die een ruwe benadering geeft van de LIC waarde. (Olivieri, Nathan et al. 1994). Echter bij NTDT kan er een onderschatting van de mate van ijzerstapeling optreden door alleen het ferritine te bepalen (Taher, Vichinsky et al. 2013).</p>	B
<p>1c. Ijzerstapeling in de lever treedt eerder op dan in het hart. De mate van ijzerstapeling in het hart kan worden ingeschat met behulp van de T2* bepaling van een MRI scan.(Porter and Davis 2002)</p>	B
<p>2a. Bij TDT patiënten wordt ontijzerings therapie aanbevolen na een cumulatieve bloedtransfusie aantal van &gt;20-25 eenheden of een LIC waarde &gt;3 mg/g drooggewicht Fe. (Rachmilewitz and Giardina 2011)</p>	B
<p>2b. Ontijzerings therapie bij NTDT patiënten &gt;10 jaar wordt aanbevolen vanaf een LIC waarde &gt;5 mg/g drooggewicht FE of een serum ferritine van &gt;800 ng/ml. (Taher, Vichinsky et al. 2013)</p>	B
<p>3a. De eerste lijns medicamenteuze behandeling van ijzerstapeling bij TDT patiënten bestaat uit deferasirox, zowel voor kinderen als voor volwassenen (2014). De dosering van deferasirox is tussen 14-28 mg/kg per dag.</p>	A

3b. Alternatieve behandeling van ijzerstapeling bij TDT patiënten na deferasirox is deferoxamine via een subcutane injectie met een pompje, in een dosering van 20-40mg/kg/dag gedurende een aantal uur achter elkaar. (2014)	A
3c. Deferipron heeft zijn ontijzeringswerking vooral bewezen in cardiale ijzerstapeling. (Rachmilewitz and Giardina 2011)	A
3d. Medicamenteuze behandeling van ijzerstapeling van NTDT patiënten bestaat alleen uit deferasirox. (Taher, Vichinsky et al. 2013)	A
3e. Combinatie therapie met deferipron en deferoxamine hebben een toegevoegde waarde om extra ijzer te cheleren. (Rachmilewitz and Giardina 2011)  Andere combinatietherapieën waaronder deferasirox met deferipron zijn alleen in experimentele studies onderzocht en laten wisselende uitkomsten zien. (Galanello, Agus et al. 2010)	B
Het risico op hartfalen neemt toe naarmate de T2* waarde afneemt <10 ms. In het geval van acuut hartfalen (meestal bij een T2* waarde < 6 ms) wordt geadviseerd om continue 24 uren deferoxamine infuus te starten, eventueel in combinatie met deferipron in een standaard dosering. Deze combinatietherapie is over een lange periode van maanden en jaren vaak noodzakelijk om een stijging in de T2* waarde te zien (Farmakis, 2022).	B

## Onderbouwing

Ijzerstapeling treedt op zodra de opname van ijzer gedurende een bepaalde periode verhoogd is. Dit gebeurt als gevolg van bloedtransfusies (bij TDT) of een toegenomen absorptie van ijzer door het gastro-intestinale kanaal (bij NTDT). Het lichaam heeft van nature geen fysiologisch mechanisme om een overschot aan ijzer uit te scheiden. Onbehandelde ijzerstapeling is uiteindelijk schadelijk voor alle organen en kan leiden tot hartfalen, cirrose met kans op de ontwikkeling van een hepatocellulair carcinoom, groeiachterstand en meerdere endocrinopathieën (Taher and Saliba 2017). Tijdens een bloedtransfusie komt er gemiddeld 200mg ijzer het lichaam binnen. Dit is equivalent met 0,32-0,64mg/kg ijzer per dag. Bij NTDT patiënten treedt ijzerstapeling trager op dan bij TDT patiënten, echter door het cumulatieve proces zijn er aanwijzingen dat in onbehandelde NTDT patiënten, de mate van ijzerstapeling na een leeftijd van 10 jaar al schadelijke gevolgen kan hebben (Taher, Musallam et al. 2010, Musallam, Cappellini et al. 2012).

De meest betrouwbare methode om op orgaaniveau de mate van ijzerstapeling te meten, is het vervaardigen van een MRI scan. Er zijn speciale meettechnieken die het mogelijk maken om ijzerinhoud in de lever, LIC waarde, of in het hart te bepalen, de T2\* setting (Wood and Ghugre 2008) (Storey, Thompson et al. 2007). In de klinische praktijk zal na het bepalen van een LIC waarde of T2\* waarde de ijzerstatus vooral worden verricht door het laagdrempelig aanvragen van een ijzerpanel in het bloed, bestaande uit een ferritine gehalte en ijzerverzadiging. Het ferritine is een acuut fase eiwit, waarbij de hoogte van de spiegel beïnvloed kan worden door meerdere factoren, waaronder een verhoogde inflammatie (Brittenham, Cohen et al. 1993). Over een langere periode gemeten is het ferritine gehalte wel van prognostische waarde bij ijzerstapeling (Borgna-Pignatti, Rugolotto et al. 2004), (Davis, O'Sullivan et al. 2004), (Olivieri, Nathan et al. 1994, Gabutti and Piga 1996). Tijdens chelatietherapie kan het voorkomen dat het serum ferritine gedurende een bepaalde tijd hoog blijft zonder een daling te laten zien. Dit wil echter niet zegen dat er op orgaaniveau geen ontijzering plaatsvindt. Bij hoge ijzerstapeling wordt eerst op orgaaniveau een afname van het ijzer gezien, vaak voordat het ferritine gehalte gaan dalen (LIC >30 mg/g drooggewicht Fe) (Adamkiewicz, Abboud et al. 2009).

Bij TDT patiënten wordt het aanbevolen vanaf een leeftijd van 2-3 jaar met ontijzeringstherapie te starten als regelmatige transfusies gegeven zijn, met een minimum van 20-25 eenheden, een ferritine gehalte  $\geq 800$  ng/ml en een LIC waarde  $\geq 3$  mg/g drooggewicht ijzer (Rachmilewitz and Giardina 2011).

Er zijn momenteel drie medicamenteuze ijzerchelatoren op de markt: deferasirox, deferoxamine en deferipron. Het aantal studies met ervaring met deze middelen is het hoogst bij TDT patiënten. Gezien de beschikbaarheid van tabletten en de vele ervaring met deferasirox, is dit middel de eerste keus behandeling bij ijzerstapeling bij TDT patiënten (Cappellini, Bejaoui et al. 2007, Cappellini, Porter et al. 2010, Cappellini, Bejaoui et al. 2011). De dosering ligt tussen de 14 – 28 mg/kg per dag. Het gebonden ijzer-deferasirox complex wordt voor een groot deel via de ontlasting uitgescheiden. Belangrijkste nevenwerking is achteruitgang van de nierfunctie. Bij een verminderde nierfunctie wordt voorzichtigheid geboden bij het gebruik van deferasirox. Deferoxamine wordt via een subcutaan infuus met een pompje gedurende een aantal uur toegediend. Dit middel is uitgebreid bewezen effectief in het verlagen van ijzerstapeling, met name in de lever (2014). De gemiddelde dagdosering zit tussen de 20-40 mg/kg, en het ijzer-deferoxamine complex wordt zowel in de urine als de

ontlasting uitgescheiden. De combinatie van vitamine C gebruik en deferoxamine verhoogde de excretie van ijzer. Het is echter aanbevolen om de dagelijkse inname van 2-3 mg/kg vitamine C niet te overschrijden, omdat het vrijgekomen ijzer door vitamine C schadelijk kan worden (2014). Deferipron wordt hoofdzakelijk gebruikt bij ijzerstapeling met cardiale betrokkenheid, in een dagelijkse dosering van 25mg/kg driemaal per dag. Het complex van ijzer-gebonden aan deferipron wordt via de urine uitgescheiden (2014). Let bij het gebruik van deferipron op de ernstige bijwerking agranulocytose.

Het gecombineerd gebruik van ijzerchelatoren is niet op grote schaal onderzocht, er wordt dan ook geadviseerd dit niet standaard te doen. De combinatie deferoxamine en deferasirox is nog het vaakst beschreven. Een studie met een beperkt aantal TDT patiënten liet gedurende continue therapie van 12 maanden een afname in LIC en T2\* waarde zien (Lal, Porter et al. 2013). Een grote studie (Hyperion, n=60) liet een significante afname zien van ijzerstapeling zowel in lever als in het hart na 24 maanden combinatie behandeling van deferoxamine en deferasirox (Aydinok, Kattamis et al. 2015). De combinatie deferasirox en deferipron is zeer beperkt onderzocht. Met name case reports hebben het positieve effect op de ijzerstapeling laten zien (Farmaki, Tzoumari et al. 2010, Voskaridou, Christoulas et al. 2011).

Bij NTDT patiënten wordt geadviseerd bij ijzerstapeling te starten met deferasirox, daar met de andere ijzerchelatoren te weinig onderzoek bekend is. Voor elke ijzerchelator geldt, dat het maximale effect wordt bereikt als de chelator dagelijks gedurende maanden tot jaren wordt gebruikt. Het cheleren van ijzer is een tijdrovende exercitie.

Tijdens een zwangerschap wordt het gebruik van alle drie de chelatoren ontraden door het teratogene effect hebben. Alleen voor het gebruik van deferoxamine is in het derde trimester van de zwangerschap bij cardiale ijzerstapeling een positief effect gezien (Piccioni, Capone et al. 2020).

#### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

#### Referenties

- Adamkiewicz TV, Abboud MR, Paley C, Olivier N, Kirby-Allen M, Vichinsky E, et al. Serum ferritin level changes in children with sickle cell disease on chronic blood transfusion are nonlinear and are associated with iron load and liver injury. *Blood*. 2009;114(21):4632-8.
- Aydinok Y, Kattamis A, Cappellini MD, El-Beshlawy A, Origa R, Elalfy M, et al. Effects of deferasirox-deferoxamine on myocardial and liver iron in patients with severe transfusional iron overload. *Blood*. 2015;125(25):3868-77.
- Brittenham GM, Cohen AR, McLaren CE, Martin MB, Griffith PM, Nienhuis AW, et al. Hepatic iron stores and plasma ferritin concentration in patients with sickle cell anemia and thalassemia major. *Am J Hematol*. 1993;42(1):81-5.
- Borgna-Pignatti C, Rugolotto S, De Stefano P, Zhao H, Cappellini MD, Del Vecchio GC, et al. Survival and complications in patients with thalassemia major treated with transfusion and deferoxamine. 2004;89(10):1187-93.
- Cappellini MD, Bejaoui M, Agaoglu L, Porter J, Coates T, Jeng M, et al. Prospective evaluation of patient-reported outcomes during treatment with deferasirox or deferoxamine for iron overload in patients with beta-thalassemia. *Clin Ther*. 2007;29(5):909-17.
- Cappellini MD, Bejaoui M, Agaoglu L, Canatan D, Capra M, Cohen A, et al. Iron chelation with deferasirox in adult and pediatric patients with thalassemia major: efficacy and safety during 5 years' follow-up. *Blood*. 2011;118(4):884-93.
- Cappellini MD, Porter J, El-Beshlawy A, Li CK, Seymour JF, Elalfy M, et al. Tailoring iron chelation by iron intake and serum ferritin: the prospective EPIC study of deferasirox in 1744 patients with transfusion-dependent anemias. *Haematologica*. 2010;95(4):557-66.
- In: Cappellini MD, Cohen A, Porter J, Taher A, Viprakasit V, editors. *Guidelines for the Management of Transfusion Dependent Thalassemia (TDT)*. Nicosia (CY): Thalassaemia International Federation© 2014 Thalassaemia International Federation.; 2014.
- Davis BA, O'Sullivan C, Jarritt PH, Porter JB. Value of sequential monitoring of left ventricular ejection fraction in the management of thalassemia major. 2004;104(1):263-9.
- Farmaki K, Tzoumari I, Pappa C, Chouliaras G, Berdoukas V. Normalisation of total body iron load with very intensive combined chelation reverses cardiac and endocrine complications of thalassemia major. *Br J Haematol*. 2010;148(3):466-75.
- Gabutti V, Piga A. Results of long-term iron-chelating therapy. *Acta Haematol*. 1996;95(1):26-36.
- Galanello R, Agus A, Campus S, Danjou F, Giardina PJ, Grady RW. Combined iron chelation therapy. *Ann N Y Acad Sci*. 2010;1202:79-86.
- Lal A, Porter J, Sweeters N, Ng V, Evans P, Neumayr L, et al. Combined chelation therapy with deferasirox and deferoxamine in thalassemia. *Blood Cells Mol Dis*. 2013;50(2):99-104.
- Musallam KM, Cappellini MD, Wood JC, Taher AT. Iron overload in non-transfusion-dependent thalassemia: a clinical perspective. *Blood Rev*. 2012;26 Suppl 1:S16-9.
- Olivieri NF, Nathan DG, MacMillan JH, Wayne AS, Liu PP, McGee A, et al. Survival in medically treated patients with homozygous beta-thalassemia. *N Engl J Med*. 1994;331(9):574-8.
- Piccioni MG, Capone C, Vena F, Del Negro V, Schiavi MC, D'Ambrosio V, et al. Use of deferoxamine (DFO) in transfusion-dependent  $\beta$ -thalassemia during pregnancy: A retrospective study. *Taiwan J Obstet Gynecol*. 2020;59(1):120-2.
- Porter JB, Davis BA. Monitoring chelation therapy to achieve optimal outcome in the treatment of thalassaemia. *Best Pract Res Clin Haematol*. 2002;15(2):329-68.
- Rachmilewitz EA, Giardina PJ. How I treat thalassemia. 2011;118(13):3479-88.
- Storey P, Thompson AA, Carqueville CL, Wood JC, de Freitas RA, Rigsby CK. R2\* imaging of transfusional iron burden at 3T and comparison with 1.5T. *J Magn Reson Imaging*. 2007;25(3):540-7.
- Taher AT, Musallam KM, El-Beshlawy A, Karimi M, Daar S, Belhoul K, et al. Age-related complications in treatment-naïve patients with thalassaemia intermedia. *Br J Haematol*. 2010;150(4):486-9.
- Taher A, Vichinsky E, Musallam K, Cappellini MD, Viprakasit V. In: Weatherall D, editor. *Guidelines for the Management of Non Transfusion Dependent Thalassaemia (NTDT)*. Nicosia (Cyprus): Thalassaemia International Federation© 2013 Thalassaemia International Federation.; 2013.
- Taher AT, Saliba AN. Iron overload in thalassemia: different organs at different rates. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2017;2017(1):265-71.
- Voskaridou E, Christoulas D, Terpos E. Successful chelation therapy with the combination of deferasirox and deferiprone in a patient with thalassaemia major and persisting severe iron overload after single-agent chelation therapies. *Br J Haematol*. 2011;154(5):654-6.
- Wood JC, Ghugre N. Magnetic resonance imaging assessment of excess iron in thalassemia, sickle cell disease and other iron overload diseases. 2008;32(1-2):85-96.

## Uitgangsvraag 5 (Endocriene complicaties en osteoporose)

1. Welke onderzoeken zijn geïndiceerd om endocriene dysfuncties vroegtijdig op te sporen?
2. Welke preventieve maatregelen zijn geïndiceerd bij patiënten met TDT dan wel NTDT?
3. Wat is de behandeling van osteoporose?

#### Aanbevelingen

1. Management van endocriene complicaties is complex, er wordt geadviseerd om laagdrempelig een consult (kinder-)endocrinologie aan te vragen.

De volgende endocriene onderzoeken zijn geïndiceerd:

Monitoring endocriene parameters	Eerste keer op leeftijd van	Frequentie
Gewicht, lengte, zithoogte	vanaf diagnose	1x/jaar tot eindlengte bereikt
Evaluatie groeicurve	vanaf diagnose	1x/jaar
TSH, vrij T4*	Vanaf 5 jaar (TDT), 10 jaar (NTDT)	1x/jaar
Tanner stadia	vanaf 10 jaar	2x/jaar
Anamnese menarche, menstruatiecycclus	Vanaf 10 jaar	1x/jaar
Testosteron	M, na puberteit	1x/jaar
Nuchter glucose	Vanaf 10 jaar	1x/jaar
Orale glucose tolerantie test	Vanaf puberteit	1x/jaar
Ochtend cortisol (om 8:00)	Vanaf puberteit	1x/jaar
Vitamine D	Vanaf 2 jaar	1x/jaar
Serum calcium, fosfaat	Vanaf 10 jaar	1x/jaar
PTH	Bij volwassenen	1x/jaar
Zink Koper, Selenium, Ceruloplasmine, Vitamine A, C, E	Bij TDT, chelatie	1x/jaar
Botdensitometrie (BMD lumbale wervelkolom en heup)	Vanaf eind puberteit/voor transitie	A 2 jaar
<b>Op indicatie</b>		
IGF1-1, IgF-BP3, X-hand, Verder conform consensus kleine lengte	Indien groeivertraging	
Groeihormoonprovocatietest	Bij groeivertraging (na behandelen van evt. hypothyroïdie, deficiëntie voeding)	
Consult diëtiste	Indien groeivertraging	
PTH	Wanneer serum calcium verlaagd	

FSH, LH, oestradiol (V), testosteron (M), X-hand	Indien vertraagde puberteit (nog niet gestart op leeftijd 13 jaar (V), 14 jaar (M))	
---	--	--

\* Een (secundaire) bijnierschors insufficiëntie dient uitgesloten te worden voor start suppletie van schildklierhormoon.

2.

- A. Start zo vroeg mogelijk met chronische transfusies en ijzerchelatie om beenmerghyperplasie en ijzertoxiciteit te voorkomen. Zie hiervoor de aanbevelingen hoofdstuk transfusie, ijzerstapeling en ontijzering.
- B. Houd je aan het maximale doseeradvies van Deferoxamine bij kinderen (40 mg/kg/dag).
- C. Let op een adequate inname van calcium (700-1000 mg per dag).
- D. Streef Vitamine D spiegels van ~ 50 nmol/l na.
- E. Geef leefstijladviezen zoals voldoende lichamelijke activiteit, zonlicht exposure, vermijden van roken en vraag voor dieetadviezen laagdrempelig een dietist in consult.
- F. Probeer diabetes mellitus vroegtijdig op te sporen.

3.

- A. Overweeg bij volwassenen een behandeling met bisfosfonaten wanneer er sprake is van:
  - B. een BMD Z-score < -2.0 (pre-menopauze, < 50 jr.), T-score < -2.5 (postmenopauze, > 50 jr.) of
  - C. fragility fractures en/of afname van de botdichtheid ondanks adequate Vitamine D-spiegel of
  - D. bij het gebruik van hormoonbehandeling in het kader van hypogonadisme.

Bisfosfonaten	Route toediening	Dosis
Alendroninezuur	per os	10 mg 1 dd of 70 mg 1x/week
Pamidroninezuur	parenteraal	30 mg /maand
Zoledroninezuur	Parenteraal	4 mg/ 3 maanden (TIF guideline) 5 mg/jaar (Farmacotherapeutisch Kompas)
Neridroninezuur	Parenteraal	100 mg / 6 maanden

Gebruik bisfosfonaten altijd in combinatie met Vit D en Calcium suppletie. Na een behandelingsduur van 12 maanden dient een BMD-meting verricht te worden, waarna de vervolgbehandeling wordt afgestemd. Zoledroninezuur en neridroninezuur zijn middelen van eerste keuze voor thalassemie geassocieerde osteoporose (Guisti A et al., 2016, Piga et al. 2017).

Intraveneuze toediening van zoledroninezuur schijnt effectiever te zijn dan orale bisfosfonaten.

- Bij kinderen duiden vertebrale compressiefracturen ontstaan zonder hoogenergetisch trauma of lokale ziekte op osteoporose. In afwezigheid van vertebrale compressiefracturen wordt osteoporose bij kinderen gedefinieerd als:
  - BMD z-score  $\leq$  -2 én
  - Klinisch significante fracturen
    - $\geq$  2 fracturen van lange pijpbeenderen voor leeftijd 10 jaar
    - $\geq$  3 fracturen van lange pijpbeenderen voor leeftijd 19 jaar

De behandeling van osteoporose bij kinderen gebeurt altijd in overleg met een kinderendocrinoloog.

## Onderbouwing

### Inleiding

Verhoogde ijzerabsorptie door ineffektieve erythropoëse en chronische hemolytische anemie veroorzaken ijzerstapeling o.a. in de pancreas, hypofyse en bijschildklieren en kunnen leiden tot endocriene dysfunctie zoals diabetes mellitus, hypogonadisme, hypoparathyreoïdie en infertiliteit (zie hiervoor hoofdstuk zwangerschap en fertilititeit).

De behandeling met bloedtransfusies bij TDT leidt tot een onderdrukking van de ineffektieve erythropoëse, waardoor er verschil is in prevalentie van endocrinopathieën in TDT en NTDT. De prevalentie in NTDT is relatief lager, echter stijgt deze met toegenomen leeftijd.

Splenectomie, de mate van ineffektieve erythropoëse en een laag foetaal Hb gehalte worden geassocieerd met endocriene dysfuncties in NTDT. Het gebruik van Hydreia lijkt hierin een positieve rol te spelen. Bij diagnose van een hypofysaire hormoon deficiëntie is het belangrijk extra alert te zijn op mogelijke uitval van andere hypofyse-assen.

Conclusie	SORT Grade
-----------	------------

1.Management van endocriene complicaties is complex. Bij afwijkende monitoring dient de (kinder-)endocrinoloog laagdrempelig te worden betrokken.	C
2.A. Start zo vroeg mogelijk met chronische transfusies en ijzerchelatie om beenmerghyperplasie en ijzertoxiciteit te voorkomen. Zie hiervoor de aanbevelingen hoofdstuk transfusie, ijzerstapeling en ontijzering.	A
2.B. Houd je aan het maximale doseeradvies van Deferoxamine bij kinderen (40 mg/kg/dag)	B
2.C. Let op een adequate inname van calcium (700-1000 mg per dag)	B
2.D. Streef Vitamine D spiegels van ~ 50 nmol/l na	B
2.E. Geef leefstijladviezen zoals voldoende lichamelijke activiteit, zonlicht exposure, vermijden van roken en vraag voor dieetadviezen laagdrempelig een diëtist in consult	B
2.F. Probeer diabetes mellitus vroegtijdig op te sporen	B
3.A. Overweeg bij volwassenen een behandeling met bisfosfonaten wanneer er sprake is van: a. een BMD Z-score < -2.0 (pre-menopauze, < 50 jr.), T-score < -2.5 (postmenopauze, > 50 jr.) of b. fragility fractures en/of afname van de botdichtheid ondanks adequate Vitamine D-spiegel of c. bij het gebruik van hormoonbehandeling in het kader van hypogonadisme.	B
3.B. Gebruik bisfosfonaten altijd in combinatie met Vit D en Calcium suppletie. Na een behandelingsduur van 12 maanden dient een BMD meting verricht te worden, waarna de vervolgbehandeling wordt afgestemd.	B
3.C. Zoledroninezuur en neridroninezuur zijn middelen van eerste keuze voor thalassemie geassocieerde osteoporose (Guisti A et al., 2016, Piga 2017).  Intraveneuze toediening van zoledroninezuur schijnt effectiever te zijn dan orale bisfosfonaten. Zie bvg tabel voor keuze en dosering bisfosfonaten.	B

<p>3.D. Bij kinderen duiden vertebrale compressiefracturen ontstaan zonder hoogenergetisch trauma of lokale ziekte op osteoporose.</p> <p>In afwezigheid van vertebrale compressiefracturen wordt osteoporose bij kinderen gedefinieerd als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BMD z-score <math>\leq -2</math> én</li> <li>• Klinisch significante fracturen <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <math>\geq 2</math> fracturen van lange pijpbeenderen voor leeftijd 10 jr.</li> <li>◦ <math>\geq 3</math> fracturen van lange pijpbeenderen voor leeftijd 19 jr.</li> </ul> </li> </ul> <p>N.B. Bij de interpretatie van de DXA-scan dient rekening gehouden te worden met eventuele kleine lengte en/of achterlopende skeletrijping (bv bij late puberteit). Een methode om de botdichtheid te corrigeren voor de kleine lengte is het berekenen van de Bone Mineral Apparent Density (Ward et al; Arch Dis Child. 2007 Jan;92(1):53-9. doi: 10.1136/adc.2006.097642).</p>	<p>A,B</p>
<p>3.E. De behandeling van osteoporose bij kinderen gebeurt altijd in overleg met een kinderendocrinoloog.</p>	<p>C</p>

#### Samenvatting literatuur

Verhoogde ijzerabsorptie door ineffektieve erythropoïese en chronische hemolytische anemie veroorzaken ijzerstapeling o.a. in de pancreas, hypofyse en bijschildklierklieren, en kunnen leiden tot endocriene dysfunctie zoals diabetes mellitus, hypogonadisme, hypoparathyreoïdie en infertiliteit.




Figure 1. Growth and endocrine complications in thalassemia. Reproduced from Thalassaemia International Federation Study Group on Growth and Endocrine Complications in Thalassaemia (De Sanctis 2004).

#### Late puberteit en hypogonadisme

Late puberteitsontwikkeling en hypogonadotroop hypogonadisme zijn de meest voorkomende klinische gevolgen van ijzerstapeling in de hypofyse. Gonadale ijzerstapeling komt veel minder vaak voor. Bij meisjes spreekt men van vertraagde puberteit bij ontbreken van borstontwikkeling op de leeftijd van 13 jaar, bij jongens als de testes op de leeftijd van 14 jaar nog  $< 4$  ml zijn. Een stagnatie in de puberteitsontwikkeling is een relatief vaak voorkomende complicatie in patiënten met TDT met matige tot ernstige ijzerstapeling. Hierbij is er gedurende een jaar geen progressie van puberteitsstadia en een afname van de groeisnelheid. Bij meisjes kan hypogonadotroop hypogonadisme zich verder uiten als primaire of secundaire amenorroe. Prevalentie van hypogonadisme in adolescenten en volwassenen met thalassaemia major is 38% bij vrouwen en 43% bij mannen (guideline TDT, Cappellini et al.). Geadviseerde routineonderzoeken zijn een X-hand en BMD-meting, bepaling van LH, FSH en testosteron. Patiënten met thalassaemia hebben doorgaans hypogonadotroop hypogonadisme gekenmerkt door lage gonadotrofinen en oestradiol/testosteron.

Behandeling (door kinderarts-endocrinoloog): Doel is het bewerkstelligen van ontwikkeling van puberteitskenmerken, optimaliseren van de lengtegroei en voorkomen van complicaties van hypogonadisme zoals osteoporose.

Bij late puberteit kan in eerste instantie gekozen worden voor een kortdurende behandeling van ongeveer 6 maanden en hierna de behandeling te evalueren via bloedcontrole van de hypothalamus-hypofyse-gonadale as.

Meisjes: Oestrogeenbehandeling per os of transdermaal. Afhankelijk van de leeftijd, lengtegroei en het spontaan bereikte puberteitsstadium zal de startdosis worden bepaald en een schema voor ophogen tot een volwassen onderhoudsdosis. Twee jaar na start puberteitsinductie wordt een progestageen toegevoegd.

Jongens: Testosteronbehandeling intramusculair of transdermaal. Afhankelijk van de leeftijd, lengtegroei en het spontaan bereikte puberteitsstadium zal de startdosis worden bepaald en een schema voor ophogen tot een volwassen onderhoudsdosis.

## Hypothyroidie

Hypothyroidie als complicatie bij TDT is voornamelijk geassocieerd met ijzerstapeling en is ongebruikelijk in patienten met een optimaal chelatieregime. De frequentie van hypothyroidie varieert van 4 – 29% en lijkt gerelateerd aan genotype, leeftijd, ethnische variatie en verschil in behandeling (transfusie frequentie en ontijzeringstherapie) (de Sanctis et al., 2019). Zowel primaire hypothyroidie als centrale hypothyroidie komen voor. Monitoring van schildklierfunctie (vrij T4 en TSH) wordt jaarlijks geadviseerd vanaf een leeftijd van 5 jaar bij TDT en 10 jaar bij NTDT. Zonodig zullen thyroid auto-antistoffen worden bepaald in combinatie met een echografie van de schildklier.

### Gradatie van schildklier-dysfuncties:

Subklinische hypothyroidie is een combinatie van een hoog TSH met een normaal vrij T4. De combinatie van een hoog TSH met een laag vrij T4 kenmerkt klinische primaire hypothyroidie. De klassieke klinische presentatie van hypothyroidie in thalassaemia major is lastig te herkennen omdat symptomen niet specifiek zijn en gerelateerd kunnen worden aan de anemie. Ernstige hypothyroidie in TM kan zich uiten met een ernstige groeiachterstand met vertraagde puberteit, vertraagde botrijping, cardiaal falen en pericardeffusie (de Sanctis 2013). Centrale hypothyroidie wordt gekenmerkt door een verlaagd FT4 met een laag of inadequaat normaal (soms mild verhoogd) TSH.

De behandeling is afhankelijk van de ernst van de hypothyroidie. Een goede compliance van de ontijzeringstherapie kan hypothyroidie voorkomen danwel verbeteren in geval van milde subklinische hypothyroidie (TSH 5 -10 mU/L). In het geval van manifeste hypothyroidie is de behandeling met L-thyroxine. Aandacht behoort de patient met subklinische vorm van hypothyroidie en cardiomyopathie: behandeling met amiodaron (antiaritmica klasse III) kan leiden tot snelle verergering van de hypothyroidie, wat weer leidt tot achteruitgang van de cardiale functie (de Sanctis et al., 2019, Alexandrides 2000).

### Afwijkende OGTT en diabetes mellitus (DM)

Een afwijkende OGTT en diabetes mellitus zijn een veel voorkomende complicatie in TM patienten zonder optimale ontijzeringsbehandeling. Echter kan diabetes ook voorkomen bij patienten met een regelmatig transfusie regime en goede adherence van chelatietherapie. Er spelen dus ook andere bijkomende factoren een rol zoals de individuele sensitiviteit tot ijzerstapeling, chronische anemie, zink deficientie en een verhoogde collageendepositie secundair aan de verhoogde activiteit van het enzym protocollageen proline hydroxylase, dat ijzer afhankelijk is en leidt tot een verstoorde microcirculatie in de pancreas.

DM bij TM is zeldzaam gedurende de eerste tien levensjaren. Vanaf de leeftijd van 10 jaar kan een afwijkende OGTT voorkomen. De combinatie van puberteit en thalassaemie geassocieerde risicofactoren geven een gedeeltelijke verklaring voor de toename van insuline resistentie in adolescenten met thalassaemie.

De etiologie van DM is multifactorieel (genetische factoren, insuline deficiëntie, insulineresistentie en leverdysfunctie secundair aan virale hepatitis). Ijzerstapeling door chronische transfusies geeft schade aan de pancreatische b-cellen met verminderde insulinesecretie als gevolg, zie fig. 3., TIF-guideline.




Figure 3. Pathogenesis of abnormal glucose homeostasis in thalassaemia. Reproduced with permission from [De Sanctis V. TIF Congress, Dubai – 2006].

Wanneer nuchter serum glucose > 6.1 mmol/L bij jaarlijkse screening is ook een OGTT geïndiceerd. Screening door middel van een 2 h OGTT wordt geadviseerd vanaf puberteit (a 2 jaar).

### Diagnostische criteria voor OGTT:


- Nuchter glucose  $\geq 7.0$  mmol/L is diagnostisch voor DM
- OGTT-serum glucose 2h 7.8-11.0 mmol/L indiceert gestoorde glucosetolerantie
- OGTT-serum glucose 2 h  $\geq 11.1$  mmol/L is diagnostisch voor DM

Ijzerdepositie in het pancreas is de sterkste predictor voor b-cel-toxiciteit. Pancreas T2\* meting is, naast het bepalen van nuchter glucose, een mogelijke toegevoegde screeningsmethode. Verhoogde ijzerdepositie in het pancreas is een voorspeller voor een afwijkende OGTT en kan identificatie van mogelijke hoog risicopatiënten bevorderen voor dat irreversibele pancreatische schade ontstaat (Noetzli 2009, Pepe et al., 2020). Echter blijft de OGTT de gouden standaard voor evaluatie van de glucose homeostase. Screening op mogelijke hepatitis en een goede adherence chelatietherapie zijn belangrijke preventieve maatregelen.

In patienten met thalassaemie en diabetes is de prevalentie van diabetische nefropathie 13-55% (Tzoulis et al. 2014, Loebstein et al. 1998) en 13-26% heeft diabetische retinopathie (Tzoulis et al., 2014, Incorvaia et al. 1998). Macrovasculaire complicaties zijn zeldzaam echter is het risico op cardiale complicaties, hartfalen, hyperkinetische arryhtmie en myocardiële fibrose bij patienten met thalassaemie en diabetes significant verhoogd (Pepe et al. 2013).

Management van een afwijkende OGTT en DM zijn:

- Verwijzing naar een specialistisch diabetes spreekuur voor verdere evaluatie en behandeling is geïndiceerd.
- Een strikt dieet, regelmatige lichamelijke activiteit, intensivering van de ontijzeringsbehandeling (een combinatie van deferoxamine en deferipron is effectief om de b-cel functie te verbeteren, insuline secretie te bevorderen en hepatische ijzerstapeling tegen te gaan).



**Figure 5.** Therapeutic approach to abnormal glucose tolerance and diabetes in thalassaemia  
 Reproduced with permission from [De Sanctis V. TIF Congress, Dubai – 2006].

Monitoring van DM in thalassaemie patiënten is niet anders dan bij de reguliere diabetes patiënt: Het HbA1c is echter niet betrouwbaar vanwege de verkorte levensduur van de erythrocyt, de ineffectieve erythropoïese en de afhankelijkheid van chronische transfusies (de Sanctis 2013).

#### Hypoparathyreoidie (HPT)

HPT is een typische complicatie in de 2<sup>e</sup> levensdecade van TDT patiënten en wordt toegeschreven aan ijzerstapeling in de bijnierklieren. De incidentie varieert van 1.2% tot 19% en verschilt per behandelcentrum. HPT lijkt vaker voor te komen bij mannen (man/vrouw ratio = 1.35) (TIF-guideline, TDT). De meerderheid van de patiënten laat een milde vorm van HPT zien met milde hypocalciëmie en daardoor paresthesie. Ernstige symptomen zijn tetanie, convulsies of cardiaal falen (Skordis 2013).

Vanaf de leeftijd van 10 jaar (TDT-guideline adviseert 16 jaar?) wordt jaarlijks bepaling van serum calcium en serum fosfaat aanbevolen. Beoordeling in combinatie met Vitamine D-status en zonodig PTH.

Behandeling gebeurt in overleg met een kinderendocrinoloog en bestaat uit orale toediening van calcium en actief vitamine D om serum calcium spiegels te normaliseren. Soms zijn hiervoor hoge doses nodig, cave hypercalciëmie bij overbehandeling (met risico op ontwikkeling van nefrolithiasis, nefrocalcinose). Calcitriol 0.25-1.0 ug 2 dd is meestal voldoende om calcium en fosfaat spiegels te normaliseren. Een calcium rijk en fosfaat arm dieet kan worden geadviseerd.

#### Bijnierinsufficiëntie

Prevalentie van biochemische centrale bijnierinsufficiëntie onder thalassaemie patiënten varieert van 0-45% (El Kholi 2013). Symptomen kunnen soms moeilijk worden herkend doordat spierzwakte, artralgie, gewichtsverlies regelmatig bij thalassaemie patiënten voorkomen.

Het bepalen van ochtendcortisolspiegel (nuchter tussen 8-9 uur) wordt een a twee jaarlijks geadviseerd in patiënten met een groeihormoondeficiëntie. Zonodig moet een ACTH test worden verricht.

#### Osteoporose (ook wel TBD 'thalassaemia bone disease')

Osteoporose is een veel voorkomende oorzaak van morbiditeit in patiënten met TDT danwel NTD en komt voor in 40-50% van adequaat behandelde TDT-patiënten.

Gezien de ernstige toxiciteit van ijzerstapeling heeft een adequate ijzerchelatie hoogste prioriteit in de behandeling en preventie van osteoporose.

De pathogenese van osteoporose in thalassaemie is complex en multifactorieel. Naast de ontwikkeling van botdistorsie door ineffectieve erythropoëse en progressieve beenmergexpansie zijn er een aantal genetische en verworven factoren, welke leiden tot een dysbalans in bot remodeling door inhibitie van osteoblasten activiteit en een toegenomen osteoclasten activiteit met als gevolg botdestructie. Veel patiënten met thalassaemie laten een verlaagde botmineraaldichtheid (BMD) zien, welke kan worden gemeten door middel van een DEXA-scan. Een evt verlate puberteit en hypogonadisme spelen hierin een oorzakelijke rol. Ook wordt een verhoogd fractuurrisico beschreven, waarbij de relatie tussen een lage BMD en het risico op fracturen niet geheel duidelijk is. Een verlaagde botdichtheid kan ook bij kinderen met thalassaemie (< 10 jaar) worden gezien. Er is echter geen evidence voor behandeling van een lage BMD bij kinderen in de afwezigheid van klinisch significante fracturen, derhalve weinig onderbouwing om een BMD-meting te verrichten voor beëindiging van de puberteit. Bij kinderen bestaat management voornamelijk uit life style interventies zoals adequate calcium intake (suppletie van 700 – 1000mg/dag vanaf leeftijd 11 jaar), adequate Vit D-spiegels en voldoende lichamelijke activiteit.

Zonder Vitamine D-suppletie is vitamine D deficiëntie in thalassaemie patiënten zeer gebruikelijk. Vitamine D is essentieel voor calcium homeostase en mineralisatie van het skelet. Vit D-spiegels laten een directe correlatie zien met de botdichtheid. Er wordt gestreefd naar Vit D-spiegels van ~ 50 nmol/l.

Risicofactoren voor thalassaemia bone disease zijn oudere leeftijd, groeiretardatie, rugpijn, tekenen van zenuwcompressie, ernstige osteoporose, botbreuken. Een afname in lengte kan een aanwijzing zijn voor vertebrale fracturen.

Bij kinderen kan groeivertraging optreden door langdurig hoge doses deferoxamine (> 40 mg/kg/dag). Gezien het toenemend gebruik van deferasirox wordt dit nog maar zelden gezien.

#### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

#### Referenties

- Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT), 3<sup>rd</sup> edition, Cappellini et al.
- Guidelines for the management of non transfusion dependent thalassaemia (NTDT), 2<sup>nd</sup> edition, Taher et al.
- Impact of bone disease and pain in thalassaemia, Antonio Piga, ASH educational 2017
- Management of beta-thalassaemia-associated osteoporosis Guisti A et al., 2016
- Noetzli LJ, Papudesi J, Coates TD, et al. Pancreatic iron loading predicts cardiac iron loading in thalassaemia major. Blood 2009;114:4021-6.

- Standards of care guidelines for thalassemia, 2012, Vichinsky et al.
- Standards for the Clinical Care of Children and Adults with Thalassemia in the UK, 3<sup>rd</sup> edition 2016, Yardumian A, Telfer P, Farrukh S, Ryan K et al.

## Uitgangsvraag 6 (Trombose)

Is er plaats voor preventie van trombose bij patiënten met thalassemie?

### Aanbevelingen

- Er is geen plaats voor primaire preventie van trombose bij thalassemie
- Bij patiënten met NTDT, status na splenectomie en een niet uitgelokte trombose is het advies antistolling van onbeperkte duur te geven

Conclusie	Score
Er is geen plaats voor primaire preventie van trombose bij thalassemie	C3
Bij patiënten met NTDT, status na splenectomie en een niet uitgelokte trombose is het advies antistolling van onbeperkte duur te geven	C3

### Onderbouwing

Er is sprake van een verhoogde incidentie van veneuze en arteriële trombose bij zowel TDT als NTDT (Taher Blood 2018). Taher et al. (T en H 2006) toont een prevalentie aan van 1,65% onder alle thalassemie patiënten (TDT en NTDT, met en zonder splenectomie). Met name bij patiënten post-splenectomie is er een sterk verhoogd risico op trombose. De waarde van preventie met acetylsalicylzuur wordt beschreven in hoofdstuk splenectomie. Ook komt trombose in NTDT 4x vaker voor dan in TDT (3,9% versus 0.9%), wat waarschijnlijk verklaard wordt door onderdrukte hemolyse in transfusieafhankelijke patiënten. Circa 5-9% van de patiënten met NTDT krijgt een symptomatisch CVA (Taher T en H 2006).

In een cohort studie van 83 patiënten met NTDT en splenectomie was in 29% sprake van een trombose in 10 jaar tijd (Cappellini BJH 2000). Er zijn sporadische rapporten van verlaagde proteïne C en antitrombine deficiëntie in kinderen met thalassemie (Abd El Mabood SA 2018). Risicofactoren voor het optreden van trombose bij thalassemie zijn: status na splenectomie, leeftijd > 35 jaar, Hb < 5,5 mmol/L, trombocytten >500×10<sup>9</sup>/L. Ondanks een verhoogde kans op trombose na splenectomie bij deze patiëntengroep, gemiddeld na 8 jaar, zijn er geen klinische interventie studies gepubliceerd om primaire preventie van trombose voor deze patiëntengroep te adviseren (Taher, JTH 2010)

Er zijn geen data bekend over recidief trombose bij thalassemie patiënten. Ten aanzien van secundaire preventie van veneuze trombose bij NTDT zijn geen studies bekend. Derhalve wordt aanbevolen de Nederlandse NIV richtlijn antitrombotisch beleid te volgen ten aanzien van secundaire preventie bij erfelijke trombofilie. Kort gezegd betekent dit dat bij een niet uitgelokte veneuze trombose antistolling wordt geadviseerd van onbeperkte duur met een jaarlijkse afweging van bloeding-versus tromboserisico. Indien sprake is van een uitgelokte trombose dient de bovengenoemde richtlijn geraadpleegd te worden.

### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

### Referenties

- Abd El Mabood S, Fahmy DM, Akef A, El Sallab S. Protein C and Anti-Thrombin-III Deficiency in Children With Beta-Thalassemia. J Hematol. 2018 May;7(2):62-68.
- Cappellini MD, Robbiolo L, Bottasso BM, Coppola R, Fiorelli G, Mannucci AP. Venous thromboembolism and hypercoagulability in splenectomized patients with thalassaemia intermedia. Br J Haematol. 2000 Nov;111(2):467-73.
- Cappellini MD, Farmakis D, Porter J and Taher A. Guidelines for the management of transfusion dependent thalassemia (TDT) 4th edition 2021. Publishers Thalassemia International Federation.
- Taher A, Isma'el H, Mehio G, Bignamini D, Kattamis A, Rachmilewitz EA, Cappellini MD. Prevalence of thromboembolic events among 8,860 patients with thalassaemia major and intermedia in the Mediterranean area and Iran. Thromb Haemost. 2006 Oct;96(4):488-91.
- Taher AT, Musallam KM, Karimi M, El-Beshlawy A, Belhoul K, Daar S, Saned M, Cesaretti C, Cappellini MD. Splenectomy and thrombosis: the case of thalassemia intermedia. J Thromb Haemost. 2010 Oct;8(10):2152-8.
- Taher A, Vichinsky E, Cappellini MD, Viprakasit V. 2nd edition 2017 Guidelines for the Management of Non Transfusion Dependent Thalassaemia (NTDT), TIF 2013. Publishers Thalassemia International Federation.
- Taher AT, Cappellini MD. How I manage medical complications of β-thalassemia in adults. Blood. 2018 Oct 25;132(17):1781-1791.

## Uitgangsvraag 7 (Pulmonale hypertensie)

- Hoe wordt de diagnose pulmonale hypertensie gesteld?
- Wat zijn de behandeladviezen?

### Aanbevelingen

- Het advies is alle thalassemie patiënten (zowel intermedia als major) te screenen op pulmonale hypertensie (PH) met echocardiografie. De PAP druk kan ingeschat worden door de regurgitatiesnelheid over de tricuspidalisklep te meten. Bij een tricuspid regurgitation velocity (TRV) van >3,2 m/s (positief) en bij een TRV tussen de 2,5 en 3,2 m/s met klachten, wordt een consult longarts ter verdere evaluatie geadviseerd (i.c. rechter hartkatheterisatie) (zie onderstaand stroomdiagram). In alle andere gevallen dient echocardiografie jaarlijks herhaald te worden. Bij een TRV < 2,5 m/s kan een controle iedere 3 jaar volstaan tenzij er een klinische verdenking ontstaat op PH (zie onderstaande schema).
- Indien de PH het gevolg is van chronische pulmonale embolieën wordt primair antistolling geadviseerd. Een zich ontwikkelende PH reageert bij β-thalassemie vaak op

intensificatie van de transfusies. Bij primaire (pre-capillaire) PH kunnen PH specifieke behandelingen (zoals PDE5 remmers, prostacycline agonisten en endotheline receptor agonisten) overwogen worden in overleg met een longarts gespecialiseerd in de behandeling van PH. Bij post-capillaire pulmonale hypertensie ligt de nadruk op het verbeteren van de linkerventrikelfunctie.

#### Algoritme voor de diagnostiek naar pulmonale hypertensie




Figure 1. Beleid t.a.v. diagnose, preventie, and behandeling van PH in volwassenen met  $\beta$ -thalassemia. NB: Patienten met TRV  $< 2.5 \text{ m/s}$  wordt echo cor na 3-5 jaar geadviseerd. nRBC, nucleated red blood cell count; PHT, pulmonary hypertension.

Conclusie	score
1x/3 jaar echocardiografie met TRV bepaling (vanaf 15 jaar oud, o.i.eerder)	B3
TRV 2,5 – 3,2 m/s, alleen katheterisatie bij klachten en anders echo jaarlijks herhalen	B3
TRV $\geq 3,2 \text{ m/sec}$ , optimalisatie transfusiebeleid en consulteer een longarts of cardioloog met PH expertise voor rechter hartkatheterisatie en overweeg behandeling	C3

#### Onderbouwing

PH wordt gedefinieerd als een toename van de gemiddelde PAP druk  $> 25 \text{ mmHg}$  gemeten met rechter hartkatheterisatie. PH bij thalassemie komt zeker voor met name bij NTDT (Vlados 2012 en Morris 2010). Studies die middels echocardiografie PH beoordelen, tonen bij 40-50% patiënten met NTDT en 10-75% bij TDT afwijkingen mogelijk passend bij PH aan (Fraidenburg ANN NYA SC 2016). In deze studies werd ook aangetoond dat 33% van de patiënten met thalassemie een TRV 2,5-3,2 m/s heeft en 5% een TRV  $> 3 \text{ m/s}$ . Rechter hartkatheterisatie bevestigde bij 94% van de patiënten met een TRV  $> 3,2 \text{ m/s}$  een PH, terwijl dit percentage onbekend is bij TRV tussen 2,5 en 3,2 (Derchi Circulation 2014).

Bekende voorspellende factoren voor PH bij NTDT en TDT zijn leeftijd, status na splenectomie, ernstige hemolyse, hepatitis C, verhoogde trombose neiging of eerdere trombose en de mate van ijzerstapeling (Fraidenburg, Ann 2016). In de enige publicatie waarin rechter hartkatheterisatie de aanwezige PH bevestigde, werd geen associatie gevonden tussen de ferritine waarde en PH (derchi). In totaal betrof het hier 27  $\beta$ -thalassemie patiënten.

Ook kan PH het gevolg zijn van arteriële hypertensie, veneuze hypertensie of PH van chronische longziekte of chronische trombo-embolische ziekte.

Er bestaan geen prospectieve placebo gecontroleerde trials voor de behandeling van PH bij thalassemie. Een positief effect werd gesuggereerd in NTDT van hydroxycarbamide, evt. in combinatie met L-carnitine (Fraidenburg, Amoozgar EJM 2011, Karimi EJM 2009 en EJM 2010), maar gerandomiseerde studies ontbreken. Beperkte case reports en case series zijn gemeld met sildenafil (Littera, Derchi, Corrales, Morris) en prostacycline agonisten en endotheline antagonist (Anthi, Tam, Ussavarungsi en Burger).

Het valt te overwegen het transfusiebeleid aan te scherpen voor patiënten met een TRV  $> 2,5 \text{ m/s}$  en symptomen passend bij PH en derhalve te streven naar volledige onderdrukking van de ineffektieve erythropoëse (Taher Blood 2010).

De waarde van NT-proBNP bij de diagnostiek van pulmonale hypertensie is niet bekend. Er is wel aangetoond dat een verhoogd NT-proBNP een relatie heeft met diastolische dysfunctie (2010 D.T. Kremastinos, Cong Heartfailure, D.T Kremastinos, 2010, Am Heart J).

#### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

## Referenties

- Anthi A, Tsangaris I, Hamodraka ES, Lekakis J, Armaganidis A, Orfanos SE. Treatment with bosentan in a patient with thalassemia intermedia and pulmonary arterial hypertension. *Blood*. 2012 Aug 16;120(7):1531-2.
- Antonios P Vlahos 1, Frideriki P Koutsouka, Nikolaos D Papamichael, Alexandros Makis, Giannis G Baltogiannis, Eleni Athanasiou, Nikolaos Chaliasos, Konstantinos L Bourantas, Theofilos M Kolettis. Determinants of pulmonary hypertension in patients with Beta-thalassemia major and normal ventricular function. *Acta Haematol*. 2012;128(2):124-9.
- Amoozgar H, Farhani N, Karimi M. Risk factors for pulmonary hypertension in patients with thalassemia intermedia. *Eur J Haematol*. 2010 Dec;85(6):549-51.
- Cappellini 2017MD, Farmakis D, Porter J and Taher A. Guidelines for the management of transfusion dependent thalassemia (TDT), 4th edition 2021. Publishers Thalassemia International Federation. ,
- Correale M, De Rosa F, Ieva R, Di Biase M, Brunetti ND. Long-term treatment with high-dose of sildenafil in a thalassaemic patient with pulmonary hypertension. *Monaldi Arch Chest Dis*. 2012 Jun;78(2):105-6.
- Derchi G, Forni GL, Formisano F, Cappellini MD, Galanello R, D'Ascola G, Bina P, Magnano C, Lamagna M. Efficacy and safety of sildenafil in the treatment of severe pulmonary hypertension in patients with hemoglobinopathies. 2005 Apr;90(4):452-8.
- Karimi M, Borzouee M, Mehrabani A, Cohan N. Echocardiographic finding in beta-thalassemia intermedia and major: absence of pulmonary hypertension following hydroxyurea treatment in beta-thalassemia intermedia. *Eur J Haematol*. 2009 Mar;82(3):213-8.
- Karimi M, Musallam KM, Cappellini MD, Daar S, El-Beshlawy A, Belhoul K, Saned MS, Temraz S, Koussa S, Taher AT. Risk factors for pulmonary hypertension in patients with  $\beta$  thalassemia intermedia. *Eur J Intern Med*. 2011 Dec;22(6):607-10.
- Littera R, La Nasa G, Derchi G, Cappellini MD, Chang CY, Contu L. Long-term treatment with sildenafil in a thalassaemic patient with pulmonary hypertension. 2002 Aug 15;100(4):1516-7.
- Morris CR, Vichinsky EP. Pulmonary hypertension in thalassemia. *Ann N Y Acad Sci*. 2010 Aug;1202:205-13.
- Morris CR, Kim HY, Wood J, Porter JB, Klings ES, Trachtenberg FL, Sweeters N, Olivieri NF, Kwiatkowski JL, Virzi L, Singer ST, Taher A, Neufeld EJ, Thompson AA, Sachdev V, Larkin S, Suh JH, Kuypers FA, Vichinsky EP; Thalassemia Clinical Research Network. Sildenafil therapy in thalassemia patients with Doppler-defined risk of pulmonary hypertension. 2013 Sep;98(9):1359-67.
- Taher A, Vichinsky E, Cappellini MD, Viprakasit V. Guidelines for the Management of Non Transfusion Dependent Thalassemia (NTDT), 2nd edition 2017. Publishers Thalassemia International Federation.
- Tam DH, Farber HW. Pulmonary hypertension and beta-thalassemia major: report of a case, its treatment, and a review of the literature. *Am J Hematol*. 2006 Jun;81(6):443-7.
- Ussavarungsi K, Burger CD. Pulmonary arterial hypertension in a patient with  $\beta$ -thalassaemia intermedia and reversal with infusion epoprostenol then transition to oral calcium channel blocker therapy: review of literature. *Pulm Circ*. 2014 Sep;4(3):520-6.

## Uitgangsvraag 8 (Ulcus cruris)

Welke behandeladviezen worden gegeven in het geval van een (persisterende) ulcus cruris?

### Aanbevelingen

1. Verwijs een patiënt met een (persisterend) ulcus cruris door naar de dermatoloog of plastische chirurg.
2. De beste therapeutische optie voor de behandeling van een ulcus cruris is een combinatie van goede lokale wondverzorging en een bloedtransfusie.

### Onderbouwing

#### Inleiding

Ulcus cruris is een bekende complicatie van patiënten met een NTDT, en komt minder frequent voor bij TDT patiënten (Taher, Isma'eel et al. 2006, Taher, Musallam et al. 2010, Rivella 2012, Musallam, Rivella et al. 2013). Ulcus cruris zijn vaak erg pijnlijk en kunnen hardnekkig zijn zonder adequate benadering en behandeling.

Conclusie	SORT Grade
De huid van NTDT patiënten dient tijdens een controle polibezoek altijd gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van ulceraties. (Taher, Musallam et al. 2010, Musallam, Rivella et al. 2013)	C
Patiënten met een ulcus cruris dienen verwezen te worden naar een dermatoloog of een plastisch chirurg. (Musallam, Rivella et al. 2013)	C
De beste behandeloptie om een (persisterende) ulcus cruris te behandelen zijn directe lokale wondverzorging en bloedtransfusies. (Taher, Musallam et al. 2010, Karimi, Cohan et al. 2014)	B

Andere behandelopties voor  
persisterende ulcus cruris zijn (geen  
klinische trials beschikbaar):

\* hydroxycarbamide (Gamberini, Fortini  
et al. 2004, Matta, Abbas et al. 2014)

\* hyperbare zuurstof (Karimi, Cohan et  
al. 2008)

\* huidtransplantatie (Karimi, Cohan et al.  
2008)

B

### Samenvatting literatuur

Ulcus cruris is een hardnekkige complicatie van met name NTDT patiënten waarbij de incidentie toeneemt bij gevorderde leeftijd (Wu, Shih et al. 1992, Taher, Musallam et al. 2010, Musallam, Rivella et al. 2013). Huidulceraties ontstaan als de oxygenatie van de huid vermindert waardoor het subcutane weefsel erg kwetsbaar wordt en deze barrière eenvoudig kapot kan gaan bij minimaal trauma. Risicofactoren voor het ontwikkelen van ulcus cruris zijn ernstige anemie met ineffektieve erythropoëse, status na splenectomie en hypercoagulabiliteit (Haidar, Mhaidli et al. 2010, Musallam, Taher et al. 2011, Musallam, Sankaran et al. 2012). Andere bijkomende factoren die een ulcus kunnen induceren zijn veneuze stase met een verhoogd druk op de erythrocytenmembraan waardoor plaatselijk erythrocyten kapot gaan en door een slechtere circulatie (ophoping afvalstoffen) kan er een defect van de huid optreden en minder snel genezen, rechtszijdig hartfalen en huidinfecties. IJzerstapeling is ook gemeld als belangrijke factor bij het optreden van een ulcus cruris, vooral bij lokale stapeling van ijzer (Ackerman 2011). De belangrijkste behandelopties naast een goede wondverzorging met specialistische kennis van een dermatoloog of plastische chirurg (Musallam, Rivella et al. 2013), zijn het geven van bloedtransfusies (Taher, Musallam et al. 2010, Karimi, Cohan et al. 2014). Het effect van hydroxycarbamide bestaat uit het ophogen van het foetale hemoglobine en hiermee vaak het verbeteren van de anemie maar ook de verbeterde deformabiliteit van de erythrocyten en het verminderen van de mate van hypercoagulabiliteit (Musallam, Taher et al. 2013). Het gebruik van hyperbare zuurstof heeft in enkele studies een positief effect laten zien in gevallen waarbij weefsel hypoxie de oorzakelijke factor was in het proces van ulcusvorming (Gimmon, Wexler et al. 1982). Huidtransplantatie is ingezet in de behandeling van persisterende ulcus cruris (Gimmon, Wexler et al. 1982).

### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

### Referenties

- Ackerman Z. Local iron overload in chronic leg ulcers. *Isr Med Assoc J.* 2011;13(10):647.
- Gamberini MR, Fortini M, De Sanctis V. Healing of leg ulcers with hydroxyurea in thalassaemia intermedia patients with associated endocrine complications. *Pediatr Endocrinol Rev.* 2004;2 Suppl 2:319-22.
- Gimmon Z, Wexler MR, Rachmilewitz EA. Juvenile leg ulceration in beta-thalassemia major and intermedia. *Plast Reconstr Surg.* 1982;69(2):320-5.
- Haidar R, Mhaidli H, Taher AT. Paraspinal extramedullary hematopoiesis in patients with thalassemia intermedia. *Eur Spine J.* 2010;19(6):871-8.
- Karimi M, Cohan N, Bagheri MH, Lotfi M, Omidvari S, Geramizadeh B. A lump on the head. 2008;372(9647):1436.
- Karimi M, Cohan N, De Sanctis V, Mallat NS, Taher A. Guidelines for diagnosis and management of Beta-thalassemia intermedia. *Pediatr Hematol Oncol.* 2014;31(7):583-96.
- Matta BN, Abbas O, Maakaron JE, Koussa S, Daderian RH, Taher AT. Leg ulcers in patients with  $\beta$ -thalassaemia intermedia: a single centre's experience. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2014;28(9):1245-50.
- Musallam KM, Taher AT, Duca L, Cesaretti C, Halawi R, Cappellini MD. Levels of growth differentiation factor-15 are high and correlate with clinical severity in transfusion-independent patients with  $\beta$  thalassemia intermedia. *Blood Cells Mol Dis.* 2011;47(4):232-4.
- Musallam KM, Sankaran VG, Cappellini MD, Duca L, Nathan DG, Taher AT. Fetal hemoglobin levels and morbidity in untransfused patients with  $\beta$ -thalassaemia intermedia. 2012;119(2):364-7.
- Musallam KM, Rivella S, Vichinsky E, Rachmilewitz EA. Non-transfusion-dependent thalassemias. *Haematologica.* 2013;98(6):833-44.
- Musallam KM, Taher AT, Cappellini MD, Sankaran VG. Clinical experience with fetal hemoglobin induction therapy in patients with  $\beta$ -thalassaemia. 2013;121(12):2199-212; quiz 372.
- Rivella S. The role of ineffective erythropoiesis in non-transfusion-dependent thalassemia. *Blood Rev.* 2012;26 Suppl 1(0 1):S12-5.
- Taher A, Isma'el H, Cappellini MD. Thalassemia intermedia: revisited. *Blood Cells Mol Dis.* 2006;37(1):12-20.
- Taher AT, Musallam KM, Karimi M, El-Beshlawy A, Belhoul K, Daar S, et al. Overview on practices in thalassemia intermedia management aiming for lowering complication rates across a region of endemicity: the OPTIMAL CARE study. 2010;115(10):1886-92.
- Taher AT, Musallam KM, El-Beshlawy A, Karimi M, Daar S, Belhoul K, et al. Age-related complications in treatment-naïve patients with thalassaemia intermedia. *Br J Haematol.* 2010;150(4):486-9.
- Wu JH, Shih LY, Kuo TT, Lan RS. Intrathoracic extramedullary hematopoietic tumor in hemoglobin H disease. *Am J Hematol.* 1992;41(4):285-8.

## Uitgangsvraag 9 (Fertiliteit, zwangerschap en counseling)

1. Welke aspecten zijn belangrijk bij de genetische counseling?
2. Welke adviezen worden gegeven voor een eventuele zwangerschap om de fertiliteit te optimaliseren en complicaties tijdens de zwangerschap te verminderen?
3. Welke controles en maatregelen worden toegepast tijdens de zwangerschap?

### Aanbevelingen

1. Benoem tijdens de counseling van een koppel het risico op een ernstig aangedaan kind. Dit geldt alleen als de partner drager is of zelf ook aangedaan, anders is er geen risico op een ernstige vorm van Hb-pathie voor het kind. Geef aan dat de volgende medicatie tijdens de zwangerschap niet gebruikt mogen worden: ijzerchelatoren (alleen deferoxamine in specifieke gevallen in het derde trimester van de zwangerschap), bisfosfonaten, interferon, ribavirine en hydroxycarbamide. Benadruk juist het gebruik van foliumzuur, calcium en vitamine D.
2. Maak voor de totstandkoming van een zwangerschap een inschatting van de mate van ijzerstapeling, de cor functie, de endocriene assen, de botdensiteit, de functie van de lever, de vitale status van de moeder, en beoordeel de bloedgroep antigeenstatus en aanwezigheid van allo-antistoffen. Kijk voor de tijdsindicaties voor orgaancomplicatiescreening en controles in het bijbehorende hoofdstuk over poliklinische follow up.
3. Controleer een zwangere thalassemie patiënt (NTDT en TDT) in een hemoglobinoopathie kenniscentrum in nauw contact met de gynaecoloog en bepaal hierbij in alle trimesters de cardiale functie, de schildklier en de leverfunctie. Laat de gynaecoloog regelmatig het ongeboren kind controleren op de groei middels echografie.

## Onderbouwing

### Inleiding

Patiënten met thalassemie major ontwikkelen vaak in de loop van hun leven een hypogonadale hypogonadisme op basis van ijzerstapeling door bloedtransfusies in de hypofyse (Skordis, Petrikos et al. 2004). Ondanks dat de puberteit vaak wat later optreedt bij transfusie onafhankelijke thalassemie patiënten, komt onvruchtbaarheid door ijzerstapeling zelden voor (Origa, Piga et al. 2010). Een goede begeleiding vanaf het moment van de zwangerschapswens tot het volbrengen van de partus voorkomt complicaties bij de moeder en de baby.

Conclusie	SORT Grade
1a. Gezien het hoge risico op orgaancomplicaties die gepaard gaan met de diagnose transfusie (on)afhankelijke thalassemie wordt het aangeraden om uitgebreide counseling aan te bieden aan koppels die een kindwens hebben en waarbij een kans bestaat op een ernstig aangedaan kindje (Taher, Vichinsky et al. 2013, 2014)	C
1b. Tijdens de counseling dient besproken te worden welke medicatie gedurende zwangerschap gestopt moet worden en welke gezondheidsrisico's kunnen optreden tijdens de zwangerschap voor de zwangere vrouw met thalassemie (Taher, Vichinsky et al. 2013, 2014)	C
2a. Behandeling van fertiliteitsproblemen dient plaats te vinden in een centrum waar thalassemie patiënten worden behandeld door een ervaren hematoloog, in samenwerking met een internist-endocrinoloog en fertiliteitsartsen (Society 2016). Voor het behoud van fertiliteit dient een endocriene evaluatie plaats te vinden (Taher, Musallam et al. 2009, Belhou, Bakir et al. 2012).	C
2b. De grootste gezondheidsrisico's voor een zwangere vrouw met thalassemie worden bepaald door complicaties die kunnen optreden als gevolg van ijzerstapeling, cardiomyopathie, gestoorde botdensiteit, leverfunctiestoornissen, transmissie van virussen en allo-immunisatie (Taher, Vichinsky et al. 2013, 2014)	B
3a. De gezondheid van een pasgeboren baby van een moeder met thalassemie wordt het best gegarandeerd als een zwangere vrouw behandeld wordt in een multidisciplinaire setting (Aessopos, Karabatsos et al. 1999, Tuck 2005, Ansari, Azarkeivan et al. 2006)	B
3b. Tijdens de zwangerschap dient op regelmatige basis in alle trimesters de cardiale functie, de schildklier en de leverfunctie gecontroleerd te worden. De gynaecoloog controleert middels herhaalde echografie de groeivordering van het ongeboren kindje (Society 2016)	C

## Samenvatting literatuur

Patiënten met een transfusie afhankelijke thalassaemie die van jong af aan chronische bloedtransfusies krijgen met optimale controle van hun ijzerstatus, hebben de grootste kans hun fertiliteit te behouden en zwanger te worden. Het merendeel van de TDT patiënten zal echter in enigermate te maken krijgen van ijzerstapeling van de hypofyse met subfertiliteit tot gevolg (Skordis, Petrikos et al. 2004). NTDT patiënten hebben vaak een later intredende puberteit, maar meestal een gepreserveerde vruchtbaarheid (Nassar, Usta et al. 2006, Nassar, Naja et al. 2008, Origa, Piga et al. 2010, Roumi, Moukhadder et al. 2017). Voordat een zwangerschap van een koppel die een risico hebben op een aangedaan kind met een TDT of NTDT tot stand komt, verdient het de voorkeur om een uitgebreide counseling te bieden. In deze counseling moet het zwaartepunt liggen op een drietal onderwerpen:

\* de huidige gezondheid van vrouw met TDT of NTDT

\* medicatie die niet meer gebruikt mag worden tijdens de zwangerschap. In het algemeen zijn dit de ijzerchelatoren, bisfotonaten, specifieke medicatie die gebruikt wordt in de behandeling van hepatitis C (interferon en ribavirine) en hydroxycarbamide (2014).

\* de gezondheidsrisico's die kunnen optreden voor de zwangere vrouw

Indien een koppel te maken krijgt met problemen rondom de fertiliteit, is het van belang dat het koppel voor aanvullende onderzoek (voor beide partners) worden doorverwezen naar een fertilitiarts binnen het hemoglobinopathie kenniscentrum (Society 2016). Voor de zwangerschap dient het aanbevolen te worden een goede inschatting te maken van de conditie van de vrouw (Society 2016). Aandachtspunten hierbij zijn: a. evaluatie van de hartfunctie waarbij een inschatting gemaakt wordt van de pompfunctie middels echocardiografie, b. glucose huishouding en schildklierfunctie, c. botdensiteitstatus gemeten met een Dexascan en een d. overzicht van de bloedgroepantigenen en mogelijk allo-antigenen.

Medicatie die tijdens een zwangerschap worden aangeraden zijn foliumzuur, calcium en vitamine D. De zwangere vrouw dient het beste in een multidisciplinair team gecontroleerd te worden tijdens haar zwangerschap waarbij er nauwe betrokkenheid is van de hematoloog, kinderhematoloog, gynaecoloog en verloskundige (Aessopos, Karabatsos et al. 1999, Tuck 2005, Ansari, Azarkeivan et al. 2006). Tijdens de zwangerschap dient de hematoloog in elk trimester op de hoogte te zijn van mogelijke veranderingen in de functie van het hart middels het laagdrempelig vervaardigen van een echocardiografie, de lever functie en de schildklier (Leung and Lao 2012). Indien de pompfunctie verslechterd in het tweede of derde trimester door ijzerstapeling, kan overwogen worden om deferoxamine te starten. In onderzoek is een goed herstel van de pompfunctie bewezen met een succesvolle zwangerschap (Singer and Vichinsky 1999, Tsironi, Ladis et al. 2005, Bajoria and Chatterjee 2009).

In het kraambed kan gebruik van profylactische dosis LMWH worden aangeraden aan vrouwen met een verhoogd risico op een trombose. Bij deze overweging dienen de volgende punten meegewogen te worden; al dan niet hebben ondergaan van een splenectomie in de voorgeschiedenis, hoogte van de trombocyten in het kraambed, ondergaan van een chronisch transfusieschema, eerdere trombotische complicaties (Nassar, Usta et al. 2006).

## Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

## Referenties

- (2014). Guidelines for the Management of Transfusion Dependent Thalassaemia (TDT). M. D. Cappellini, A. Cohen, J. Porter, A. Taher and V. Viprakasit. Nicosia (CY), Thalassaemia International Federation© 2014 Thalassaemia International Federation.
- Aessopos A, Karabatsos F, Farmakis D, Katsantoni A, Hatziliami A, Youssef J, et al. Pregnancy in patients with well-treated beta-thalassaemia: outcome for mothers and newborn infants. *Am J Obstet Gynecol*. 1999;180(2 Pt 1):360-5.
- Ansari, S., A. Azarkeivan and A. Tabaroki (2006). "Pregnancy in patients treated for beta thalassaemia major in two centers (Ali Asghar Children's Hospital and Thalassaemia Clinic): outcome for mothers and newborn infants." *Pediatr Hematol Oncol* 23(1): 33-37.
- Bajoria, R. and R. Chatterjee (2009). "Current perspectives of fertility and pregnancy in thalassaemia." *Hemoglobin* 33 Suppl 1: S131-135.
- Belhoul KM, Bakir ML, Saned MS, Kadhim AM, Musallam KM, Taher AT. Serum ferritin levels and endocrinopathy in medically treated patients with  $\beta$  thalassaemia major. *Ann Hematol*. 2012;91(7):1107-14.
- Leung, T. Y. and T. T. Lao (2012). "Thalassaemia in pregnancy." *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 26(1): 37-51.
- Nassar, A. H., M. Naja, C. Cesaretti, B. Eprassi, M. D. Cappellini and A. Taher (2008). "Pregnancy outcome in patients with beta-thalassaemia intermedia at two tertiary care centers, in Beirut and Milan." *Haematologica*93(10): 1586-1587.
- Nassar, A. H., I. M. Usta, J. B. Rechdan, S. Koussa, A. Inati and A. T. Taher (2006). "Pregnancy in patients with beta-thalassaemia intermedia: outcome of mothers and newborns." *Am J Hematol* 81(7): 499-502.
- Nassar, A. H., I. M. Usta and A. M. Taher (2006). "Beta-thalassaemia intermedia and pregnancy: should we anticoagulate?" *J Thromb Haemost* 4(6): 1413-1414.
- Origa, R., A. Piga, G. Quarta, G. L. Forni, F. Longo, A. Melpignano and R. Galanello (2010). "Pregnancy and beta-thalassaemia: an Italian multicenter experience." *Haematologica* 95(3): 376-381.
- Roumi, J. E., H. M. Moukhadder, G. Graziadei, M. Pennisi, M. D. Cappellini and A. T. Taher (2017). "Pregnancy in  $\beta$ -thalassaemia intermedia at two tertiary care centers in Lebanon and Italy: A follow-up report on fetal and maternal outcomes." *Am J Hematol* 92(6): E96-e99.
- Singer, S. T. and E. P. Vichinsky (1999). "Deferoxamine treatment during pregnancy: is it harmful?" *Am J Hematol* 60(1): 24-26.
- Skordis, N., L. Petrikos, M. Toumba, M. Hadjigavriel, M. Sitarou, A. Kolnakou, G. Skordos, E. Pangalou and S. Christou (2004). "Update on fertility in thalassaemia major." *Pediatr Endocrinol Rev* 2 Suppl 2: 296-302.
- Society, U. K. T. (2016). "Standards for the Clinical Care of Children and Adults with Thalassaemia in the UK." (3rd Edition).
- Taher, A., E. Vichinsky, K. Musallam, M. D. Cappellini and V. Viprakasit (2013). Guidelines for the Management of Non Transfusion Dependent Thalassaemia (NTDT). Weatherall, Nicosia (Cyprus), Thalassaemia International Federation
- © 2013 Thalassaemia International Federation.
- Taher, A. T., K. M. Musallam and A. Inati (2009). "Iron overload: consequences, assessment, and monitoring." *Hemoglobin* 33 Suppl 1: S46-57.
- Tsironi, M., V. Ladis, Z. Margellis, S. Deftereos, C. Kattamis and A. Aessopos (2005). "Impairment of cardiac function in a successful full-term pregnancy in a homozygous beta-thalassaemia major: does chelation have a positive role?" *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 120(1): 117-118.
- Tuck, S. M. (2005). "Fertility and pregnancy in thalassaemia major." *Ann N Y Acad Sci* 1054: 300-307.

## Uitgangsvraag 10 (Splenectomie)

1. Wat zijn de indicaties voor splenectomie?
2. Is trombose profylaxe geïndiceerd rondom een splenectomie?

## Aanbevelingen

1. toegenomen transfusiebehoefte (vaak door toename miltgrootte) en adequate ontijzering niet haalbaar
  - a. hypersplenisme met ernstige cytopenieën

b. symptomatische splenomegalie

2. Peri-operatieve trombose profylaxe dient te worden gegeven tot volledige mobilisatie maar minimaal tot 4 weken postoperatief

Conclusie	Score
toename transfusiebehoefte en inadequate ontijzeringsmogelijkheid	B3
hypersplenisme met ernstige cytopenieën	B3
symptomatische splenomegalie	B3
Peri-operatieve trombose profylaxe tot volledige mobilisatie maar minimaal 4 weken postoperatief	C3

**Onderbouwing**

Ernstige hemolyse bij TDT en NTDT leidt tot progressieve splenomegalie, die de anemie kan verergeren en daardoor de transfusiebehoefte doet toenemen. Door vanaf jonge leeftijd een strikt transfusiebeleid te voeren kan splenomegalie worden voorkomen.

Splenectomie is alleen geïndiceerd als sprake is van toename van transfusiebehoefte in combinatie met inadequate ontijzering (Cohen 1989, Graziano 1981, Casale 2013). Ook een ernstige splenomegalie met klachten of hypersplenisme met diepe cytopenieën rechtvaardigt een splenectomie. Voor deze indicaties is weinig onderbouwing in de literatuur. Een Cochrane review uit 2019 (Sharma 2019) was niet conclusief door onvoldoende studies.

De belangrijkste complicaties na splenectomie zijn sepsis, trombose en pulmonale hypertensie.

(Cappellini BJH 2000/2005, Borgna-Pignatti 1998, Taher Blood 2010, Taher T en H 2006). Het vaccinatie beleid en antibiotische profylaxe rondom splenectomie zijn te vinden in de LCI richtlijn asplenie).

Het risico op trombose na splenectomie komt naar voren in een multivariate analyse van trombotische complicaties bij thalassemie (Taher). Er zijn geen prospectieve data over de incidentie van trombose na splenectomie. In een retrospectieve analyse bleek de incidentie van trombotische complicaties 29% in patiënten met NTDT en status na splenectomie. Hierbij werden echter oppervlakkig tromboflebitis, ulcera en priapisme meegerekend. Wanneer we het beperken tot DVT en longembolieën was de prevalentie 7%. Post-operatieve trombose profylaxe wordt geadviseerd tot volledige mobilisatie, maar minimaal tot 4 weken postoperatief. Dit is gebaseerd op het verhoogde voorkomen (12%) van vena porta/lienalis trombose bij patiënten met een erfelijke hemolytische anemie (Lolascone et.al Haematologica, 2017). Prospectieve studies ontbreken.

Ondanks dat splenectomie frequent genoemd wordt als risicofactor voor het ontwikkelen van pulmonale hypertensie, zijn er geen retro- of prospectieve studies die deze relatie ondersteunen (Phrommintikul Heart 2006).

**Zoekverantwoording**

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

**Referenties**

- C Borgna-Pignatti 1, S Rugolotto, P De Stefano, A Piga, F Di Gregorio, M R Gamberini, V Sabato, C Melevendi, M D Cappellini, G Verlato. Survival and disease complications in thalassemia major. Ann N Y Acad Sci. 1998 Jun 30;850:227-31.
- Cappellini 2017MD, Farmakis D, Porter J and Taher A Guidelines for the management of transfusion dependent thalassemia (TDT), 4th edition 2021. Publishers Thalassaemia International Federation. .
- Phrommintikul A, Sukonthasarn A, Kanjanavanit R, Nawarawong W. Splenectomy: a strong risk factor for pulmonary hypertension in patients with thalassaemia. Heart. 2006 Oct;92(10):1467-72.
- Taher A, Vichinsky E, Cappellini MD, Viprakasit V. Guidelines for the Management of Non Transfusion Dependent Thalassaemia (NTDT), 2nd edition 2017. Publishers Thalassaemia International Federation.

**Uitgangsvraag 11 (Hydroxyurea)**

1. Is het voorschrijven van hydroxyurea zinvol bij patiënten met een Transfusion Dependent Thalassaemia (TDT)
2. Is het voorschrijven van hydroxyurea zinvol bij patiënten met een not Transfusion Dependent Thalassaemia (NTDT)?

Conclusies	Score

Overweeg bij NTDT patiënten met symptomatische anemie te starten met hydrea 10 mg/kg en eventueel geleidelijk op te hogen tot max 20 mg/kg, waarbij in de meeste gevallen binnen 3 – 6 maanden respons verwacht mag worden.	B
Hydrea kan ook overwogen worden bij patiënten met extramedullaire pseudotumoren, pulmonale hypertensie en chronische been ulcera.	C
Voor TDT patiënten ontbreekt het aan bewijs om tot een aanbeveling wat betreft hydrea te komen	

#### Onderbouwing

Beide vragen zijn recentelijk belicht in een Cochrane meta-analyse (Ansari SH et al. 2019; Foong WC et al. 2016). Ten aanzien van TDT ontbreekt het aan studies om tot een concrete aanbeveling te komen (Ansari SH et al. 2019). Ten aanzien van de NTDT werd er wel één kleine RCT gevonden, welke 2 doseringen hydroxyurea (10 en 20 mg/kg) vergeleek bij patiënten met een HbE- $\beta$  thalassemie (n = 61) (Foong WC et al. 2016; Bohara VV et al. 2014) 10 mg/kg hydrea deed het Hb stijgen bij meer dan 50% van de patiënten, hetgeen niet gebeurde bij de hogere dosering, welke wel geassocieerd was met meer myelosuppressie (Bohara VV et al. 2014). Zowel de NTDT als ook de TDT richtlijn aangaande hydrea berusten voor een groot deel op een review artikel van Musallam et al en een groot retrospectief geanalyseerd cohort van NTDT patiënten (Musallam KM et al. 2013; Taher AT et al. 2010). De proportie patiënten waarbij het Hb stijgt met 0.62 mmol/L is 40 – 70%, waarbij respons meestal al zichtbaar wordt na 3- 6 maanden, waarbij de meeste onderzoekers hydrea gebruikten in een dosering van 10 mg/kg. Er zijn langdurige responsen beschreven. Er zijn echter ook patiënten die na 12 maanden respons verlies hadden. Patiënten met Hb Lepore of  $\delta\beta$ -thalassemie, evenals de aanwezigheid van het Xmn-1 polymorfisme lijken een betere respons te hebben (Musallam KM et al. 2013). Naast een effect op anemie en HbF lijkt het gebruik van hydrea geassocieerd met een kleinere kans op het ontstaan van extramedullaire pseudotumoren, pulmonale hypertensie, been ulcera, hypothyroïdie en osteoporose (Taher AT et al. 2010). De belangrijkste toxiciteit van hydrea is dosis afhankelijke myelosuppressie, welke gerapporteerd wordt bij 2 – 30% van de patiënten.

#### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

#### Referenties

- Ansari SH, Lassi ZS, Khowaja SM, Adil SO, Shamsi TS. Hydroxyurea (hydroxycarbamide) for transfusion-dependent  $\beta$ -thalassaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. Art. No.: CD012064. DOI: 10.1002/14651858.CD012064.pub2.
- Bohara VV, Ray S, Chakrabarti P, Ray SS, Nath UK, Chaudhuri U. Optimizing the dose of hydroxyurea therapy for patients with beta-thalassemia intermedia (Hb E-beta-thalassemia): a single center study from Eastern India. Hemoglobin 2014;38(1):44-8. [PUBMED: 24144212]
- Foong WC, Ho JJ, Loh CK, Viprasit V. Hydroxyurea for reducing blood transfusion in non-transfusion dependent beta thalassaemias. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD011579. DOI: 10.1002/14651858.CD011579.pub2.
- Musallam KM, Taher AT, Cappellini MD, Sankaran VG. Clinical experience with fetal hemoglobin induction therapy in patients with  $\beta$ -thalassemia. Blood 2013; 121 (12): 2199 – 2212
- Taher AT, Musallam KM, Karimi M, El-Beshlawy A, Belhoul K, Daar S, Saned MS, El-Chafic A, Fasulo MR, Cappellini D. Overview on practices in thalassemia intermedia management aiming for lowering complication rates across a region of endemicity: the OPTIMAL CARE study. Blood 2010; 115 (10): 1886 – 1892

## Uitgangsvraag 12 (Stamceltransplantatie)

1. Wat is de indicatie voor een allogene stamceltransplantatie?
2. Wat is het moment van aanmelding bij een stamceltransplantatiecentrum?
3. Wat is de voorkeursleeftijd voor een stamceltransplantatie?
4. Welke donortypen zijn geschikt bij allogene SCT bij thalassemie?

#### Aanbevelingen

1. Elke transfusie afhankelijke  $\alpha$  of  $\beta$  thalassemie (TDT) patiënt heeft een indicatie voor allogene stamceltransplantatie op de kinderleeftijd. Dit vind in alleen plaats in het LUMC.
2. Aanmelding bij transplantatiecentrum voor transfusieafhankelijke thalassemie wordt bij voorkeur gedaan in eerste jaar na diagnose. Bij Hb Barts bij voorkeur zodra prenatale diagnostiek bekend is en behandeld wordt met intra uterine transfusies. Bij  $\beta$  thalassemie bij voorkeur aanmelding na moleculaire bevestiging van de hielprik.
3. Bij patiënt met HbBarts zal transplantatie bij voorkeur binnen 6-12 maanden post partum plaatsvinden in verband met de vaak zeer hoog frequente transfusiebehoefte. Bij patiënten met  $\beta$  thalassemia major is de voorkeursleeftijd voor transplantatie na het 1<sup>e</sup> levensjaar, bij voorkeur voor het 2<sup>e</sup> levensjaar en in ieder geval voor het 7<sup>e</sup>. Voor patiënten met  $\beta$  thalassemia intermedia die pas op latere leeftijd transfusieafhankelijk worden, wordt bij voorkeur kort na start transfusieafhankelijkheid getransplanteerd voor zover jonger dan 18 jaar. Volwassen intermedia patiënten die transfusieafhankelijk worden, zullen individueel beoordeeld worden op transplantatie indicatie.
4. Voor volwassen transfusieafhankelijke  $\beta$  thalassemie patiënten is tot op heden in Nederland nog geen allogene transplantatieprogramma beschikbaar.
5. Bij voorkeur wordt getransplanteerd met een HLA identieke donor. Echter door verbetering van transplantatietechnieken kunnen matched unrelated donoren, mismatched unrelated donoren en haplo-identical family donoren worden gebruikt.

Conclusie	SORT Grade
-----------	------------

Elke transfusie afhankelijke $\alpha$ of $\beta$ thalassemie (TBT) patiënt heeft een indicatie voor allogene stamceltransplantatie op de kinderleeftijd (Songdej et al. 2017, Angelucci et al. Haematologica 2014)	C
Bij patiënt met Hb Barts zal transplantatie bij voorkeur binnen 6-12 maanden post partum plaatsvinden in verband met de vaak zeer hoog frequente transfusiebehoefte. Bij patiënten met $\beta$ thalassemia major is de voorkeursleeftijd voor transplantatie na het 1 <sup>e</sup> levensjaar, bij voorkeur voor het 2 <sup>e</sup> levensjaar en in ieder geval voor het 7 <sup>e</sup> levensjaar. Voor patiënten met $\beta$ thalassemia intermedia die pas op latere leeftijd transfusieafhankelijk worden, wordt bij voorkeur kort na start transfusieafhankelijkheid getransplanteerd voor zover jonger dan 18 jaar (Angelucci et al. 2014, Chunfu Li et al. 2019)	C
Bij voorkeur wordt getransplanteerd met een HLA identieke donor (Angelucci et al. Haematologica 2014, Oostenbrink et al. 2020, Shaw et al. 2021)	C

#### Onderbouwing

Door de ineffektieve hemoglobine-synthese bij patiënten met  $\beta$  thalassemieën is er sprake van een verkorte overleving van erythrocyten door hemolyse en premature afbraak van erythrocytaire voorlopers in het beenmerg (Weatherall 2001). De hierdoor ontstane chronische anemie kan onder andere beenmergexpansie, hepatosplenomegalie, groeiretardatie of hartfalen ten gevolge hebben (Cappellini et al. 2014, Taher et al. 2017, Taher et al. 2021).

Tot op heden is allogene stamceltransplantatie de enige curatieve therapie voor transfusieafhankelijke  $\alpha$  en/of  $\beta$ thalassemie. Omdat transfusieafhankelijke  $\alpha$  thalassemie en Hb Bart's in het bijzonder uitzonderlijk zijn, zullen zij in het kader van deze aanbeveling niet nader worden besproken. Van belang is bij een aangedane foetus met Hb Bart's indien gekozen wordt voor behoud van de zwangerschap, zo vroeg mogelijk te starten met intra uterine transfusies (LUMC). Post partum dient een agressief transfusiebeleid gevoerd te worden en zodra klinisch mogelijk een allogene stamceltransplantatie te worden uitgevoerd (WAKZ-LUMC). (Songdej et al. 2017, King and Higgs et al. 2018, Chmait et al. 2015, Zhang et al. 2021)

Allogene stamceltransplantatie wordt sinds 1990 uitgevoerd voor TDT. Aanvankelijk alleen met HLA identieke donoren, maar al snel ook met onverwante donoren. OS en EFS bleek afhankelijk van de mate van ijzerstapeling en daarmee gepaard gaande orgaanschade (leverfibrose). (Lucarelli et al. 1990). Met verbetering van transplantatietechnieken en vooral verbetering van de preventie en beheersing van Graft Versus Host zijn naast HLA identieke en Matched Unrelated donoren inmiddels de resultaten van mismatched en HAPLO identieke donoren vergelijkbaar (Oostenbrink et al. 2020, Angelucci et al. 2014). Introductie van post transplantatie cyclofosfamide en pre transplantatie intensieve immuunsuppressie heeft het gebruik van mismatched en HAPLO identieke donoren mogelijk gemaakt (Anurathapan et al. 2020, Shaw et al. 2021). Transplantatie resultaten zijn consistent en significant beter in kinderen dan in volwassenen. Het verdient daarom aanbeveling om de mogelijkheid van allogene stamceltransplantatie zo vroeg mogelijk in het leven te onderzoeken en zo mogelijk aan te bieden. (Li et al. 2019, Angelucci et al. 2014).

Dit is ook conform de aanbeveling in de UK thalassemie richtlijn 2016. (Standards for the Clinical Care of Children and Adults with Thalassemia in the UK, 3<sup>rd</sup> edition)

#### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

#### Referenties

- Cappellini MD, Cohen A, Porter J, Taher A, Viprakasit V. Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT). 3rd ed. Nicosia, Cyprus: Thalassaemia International Federation, 2014.
- Chmait et al; Treatment of alpha(0)-thalassemia (-(SEA)/-(SEA)) via serial fetal and post-natal transfusions: Can early fetal intervention improve outcomes? 2015 Hematology, 20:4; King and Higgs; Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2018 Nov 30; 2018(1):353-360. doi: 10.1182/asheducation-2018.1.353;
- Emanuele Angelucci et al Hematopoietic stem cell transplantation in thalassemia major and sickle cell disease: indications and management recommendations from an international expert panel Haematologica 2014, 99(5)
- Lucarelli et al Bone marrow transplantation in patients with thalassemia N Engl J Med. 1990 Feb 15; 322(7)
- Oostenbrink et al, Successful mismatched hematopoietic stem cell transplantation for pediatric hemoglobinopathy by using ATG and post-transplant cyclophosphamide. Bone Marrow Transplantation 2021, May 3
- Songdej et al, An international registry of survivors with Hb Barts's hydrops fetalis syndrome. Blood 2017; 129 (10);
- Taher A, Musallam K, Cappellini MD. Guidelines for the management of non transfusion dependent thalassaemia (NTDT). Nicosia, Cyprus: Thalassaemia International Federation, 2017.
- Taher AT, Musallam KM, Cappellini MD.  $\beta$ -Thalassemias. N Engl J Med. 2021 Feb 25; 384(8):727-743.
- United Kingdom Thalassaemia Society. Standards for the clinical care of children and adults with thalassaemia in the UK. 3rd ed. 2016 Available from:

- Weatherall DJ. Phenotype-genotype relationships in monogenic disease: lessons from the thalassaemias. Rev. Genet. 2001;2:245–55
- Zhang et al Outcomes of haemoglobin Bart's hydrops fetalis following intrauterine transfusion in Ontario, Canada Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2021 Jan;106(1)

## Uitgangsvraag 13 (Nieuwe behandelmodaliteiten)

Wie komt in aanmerking voor luspatercept?

### Aanbevelingen

1. Luspatercept is geregistreerd en wordt vergoed voor volwassen patiënten met transfusieafhankelijke (TDT) of niet transfusieafhankelijke  $\beta$ -thalassemie (NTDT). Getherapie is nog niet geregistreerd.
2. Luspatercept is geïndiceerd voor alle transfusie afhankelijke volwassen  $\beta$ -thalassemie patiënten met een transfusie behoefte van > 4 erytrocytenconcentraten/8 weken.
3. Patiënten met niet transfusieafhankelijke thalassemie en een Hb < 6,2 mmol/L komen in aanmerking voor behandeling met luspatercept om het Hb te verhogen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Conclusie	score
Patiënten >4 eenheden erytrocytenconcentraten/8wk komen in aanmerking voor luspatercept	A1
Patiënten met niet transfusieafhankelijke thalassemie en een Hb < 6,2 mmol/L komen in aanmerking voor behandeling met luspatercept	A1

### Onderbouwing

Er zijn twee nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de behandeling voor transfusie afhankelijke bèta-thalassemie. Voor behandelaren is het belangrijk dergelijke nieuwe en kostbare behandelopties voor de juiste patiënt beschikbaar te stellen. Getherapie komt nog niet beschikbaar voor transfusie afhankelijke non- $\beta^0/\beta^0$  thalassemie van 12 jaar of ouder.

Voor luspatercept geldt dat dit beschikbaar komt voor alle  $\beta$ -TDT patiënten.

#### Voorwaarden voor patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor behandeling met luspatercept

- Patiënt met TDT en een transfusiebehoefte van meer dan 4 FE/8 wk, kwalificeert voor behandeling met luspatercept.
- Indien geen reductie van transfusiebehoefte optreedt na 24 weken behandeling (circa 50% van de patiënten) dient de behandeling gestopt te worden.
- Geen reductie van transfusiebehoefte wordt gedefinieerd als <33% transfusieafname na 24 wk behandeling met luspatercept.
- Patiënten met niet transfusieafhankelijke thalassemie en een Hb < 6,2 mmol/L komen in aanmerking voor behandeling met luspatercept.
- Indien het hemoglobine gehalte bij een patiënt met niet transfusieafhankelijke thalassemie niet stijgt met minimaal 0,6 mmol/l onder luspatercept (zonder bloedtransfusie) gedurende 12 weken dient de behandeling gestopt te worden.

De volgende complicaties bij een patiënt met NTDT leiden tot transfusie afhankelijkheid en in een dergelijk geval kwalificeert een patiënt ook voor luspatercept:

- Patiënt met niet transfusie afhankelijke  $\beta$ -thalassemie (NTDT) en recidiverend ulcera of ernstige pulmonale hypertensie kwalificeert voor chronische bloedtransfusie. Deze patiënten kunnen bij transfusie afhankelijkheid uiteindelijk ook in aanmerking komen voor luspatercept. Indien geen effect van luspatercept op de transfusiebehoefte en op deze complicaties, dan classificeert deze patiënt voor getherapie. Eligibility voor getherapie en autologe SCT dient dan te worden beoordeeld.
- Patiënt met NTDT en ernstige extramedullaire hematopoëse classificeert voor chronische bloedtransfusie. Deze patiënten kunnen bij blijvende transfusie afhankelijkheid (TDT) in aanmerking komen voor luspatercept.

### Zoekverantwoording

Er is onder andere gebruikt gemaakt van bestaande richtlijnen.

### Referenties

- Piga, Luspatercept Improves Hemoglobin Levels and Blood Transfusion Requirements in a Study of Patients With  $\beta$ -thalassemia, Blood 2019 Jan 7
- [AA Thompson](#), Gene Therapy in Patients With Transfusion-Dependent  $\beta$ -Thalassemia
- Cappellini MD, [A Phase 3 Trial of Luspatercept in Patients with Transfusion-Dependent  \$\beta\$ -Thalassemia](#). N Engl J Med. March, 2020
- N Engl J Med 2018 Apr 19;378(16)

## Bijlagen

 [Spectrum](#) (36 KB)  0

 [Hema](#) (655 KB)  0

 [ENDOCRINE](#) (51 KB)  0

 [FIGURE3](#) (91 KB)  0

 [Figure5](#) (85 KB)  0

---

 [Algoritme](#) (182 KB)  0